

硫唑嘌呤 **AZATHIOPRINE** [AZ-A-THIGH-O-PREEN]

- 又名移護寧 Imuran、Teva-Azathioprine、Apo-azathioprine
- 為口服藥片或藥房特別配製的懸液劑

藥物外型是怎樣的？ **What does the medication look like?**

這種藥物有幾個牌子，您的藥物可能跟下圖的不盡相同。若有任何疑問，請向您的移植藥劑師查詢。



此藥用來醫治什麼？ **What is this medication for?**

硫唑嘌呤是一種用來降低人體免疫系統能力的藥物，防止移植器官被排斥。它令白血球變弱，以免損害新器官。

應如何服用此藥？ **How should I take this medication?**

每天都必須在相同時間服藥，令體內保持穩定的藥量水平，這是非常重要的。

硫唑嘌呤：此藥每天服用一次 (例如早上 9 時)	您的服藥時間： _____
-----------------------------	------------------

- 硫唑嘌呤可以隨餐或空腹服用。隨餐服用可有助減少胃部不適，但亦可以選擇空腹服用。請保持做法一致，若是隨餐送服，則每次都是隨餐送服；若是空腹服藥，也須每次都是空腹服藥。
- 服用硫唑嘌呤時，若同時服用名為 ACE 抑制劑的血壓藥如：benazepril (Lotensin®)、captopril (安保安 Capoten®)、enalapril (Vasotec®)、fosinopril (Monopril®)、lisinopril (Zestril, Prinivil®)、quinapril (Accupril®)、ramipril (Altace®)、trandolapril (Mavik®)、perindopril (Coversyl®)，或會降低您的白血球和紅血球。

開始服用以上任何藥物前，確保先通知您的移植團隊，因為他們或需多加監察您的血液情況。

- 若因接受醫療程序或手術而須在之前不進食任何食物（禁食），您必須仍照常原定時間以小口清水服用您的移植藥物。
- 服用硫唑嘌呤期間，切勿服用名為 **allopurinol (Zyloprim®)** 及 **febuxostat (Uloric®)** 的痛風藥物，因這可引致非常嚴重的副作用！請向您的移植藥劑師查詢。

請記住：若您已懷孕或計劃懷孕，必須盡快諮詢您的醫生或移植團隊。

漏服藥物或嘔吐藥物：Missed Dose or Vomited Dose:

若漏服了一劑藥物，在記起後即盡快補服，然後按照下次的原定服藥時間服藥。若離下次服藥時間已過了一半時間，則不用補服，只需繼續按原定時間服藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若漏服抗排斥藥多於一天，請立即通知您的移植團隊尋求進一步指示。

若在服藥後 30 分鐘內嘔吐，或在嘔吐物中看見藥物，便須再次服藥，否則只需繼續等至下次服藥時間才服下一劑。

此藥可能有什麼副作用？What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
胃灼熱、噁心、嘔吐和肚瀉	若服藥後胃部不適，可吃點食物送服硫唑嘌呤，但這問題一般在連續服藥一段時間後便會消失。若不適對您造成困擾，請通知您的醫生或移植團隊。
硫唑嘌呤可降低白血球、紅血球和血小板的數量。 受感染和流血的風險可能提高	定期驗血檢查各項血液細胞指數。 若出現以下任何情況，須通知醫生： <ul style="list-style-type: none"> ● 感染跡象或症狀（發燒或發冷、咳嗽、喉嚨痛、小便疼痛或排尿困難） ● 出血跡象（瘀血、黑便、嘔血或尿液帶血） ● 紅血球下降的跡象（感到虛弱或疲倦、短暫暈眩、頭暈）

	<p>盡量避免與正在受感染（如傷風 / 感冒）的人士有密切接觸。須經常洗手。</p>
肝臟損壞	<p>這是不常見的副作用。</p> <p>若皮膚或眼睛泛黃，或出現胃痛或腹痛，請通知醫生。您將定期驗血以監察肝功能。</p>
頭髮變稀或脫髮	<p>這是不常見的副作用。若這些情況對您造成困擾或持續不退，請通知您的醫生。</p>
癌症	<p>服用此藥可能增加患皮膚癌及其他癌症的風險。若確診患上癌症，請通知您的移植團隊。詳情請見「癌症風險」部份。</p>