



ਸਿਰੋਲਿਮਸ SIROLIMUS [SI-ROL-IMUS]

- ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਪਾਮਿਊਨ® ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਤਰਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? What does the medication look like?

<p>ਸਿਰੋਲਿਮਸ 1 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੀ ਗੋਲੀ</p> 	<p>ਸਿਰੋਲਿਮਸ 1 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ/ਮਿ.ਲਿ. ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਘੋਲ</p> 
---	--

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? What is this medication for?

ਸਿਰੋਲਿਮਸ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? How should I take this medication?

ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਸਤਰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

<p>ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵੋ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ)</p>	<p>ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ: _____</p>
--	-----------------------------------

- ਸਿਰੋਲਿਮਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜ ਬੜ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਸਾਰ ਰਹੋ ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ; ਜੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ।
- ਗ੍ਰੇਪਫਰੂਟ, ਗ੍ਰੇਪਫਰੂਟ ਦਾ ਜੂਸ, ਪੋਮੇਲੋ ਜਾਂ ਸੇਵੀਲ ਸੰਤਰਾ/ਜੂਸ ਦਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ **ਜ਼ਰੂਰ** ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਓ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੋਲਿਮਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਲੈਬ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਵੋ।

ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: Missed Dose or Vomited Dose:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੋ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? What are some possible side effects of this medication?

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Side Effect	ਇਲਾਜ Management
ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ	ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਘਟ ਫੈਟ ਅਤੇ ਘਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਚਾ	ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰੋਲਿਮਸ ਖੂਨ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਕਣਾਂ, ਲਾਲ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈੱਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।	ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਸੋ: <ul style="list-style-type: none"> ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ, ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ, ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ) ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੋਵੋ। ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਰਗੜਾਂ, ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ, ਉਲਟੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਖੂਨ) ਖੂਨ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਣਾਂ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਥਕੇਵਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ)
ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮ (ਅਲਸਰ)	ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੋ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਅਲਸਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰੋਲਿਮਸ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਅਲਸਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਤਰਲ /ਪੇਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਹਾਸੇ	ਜੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜ਼ਖਮ ਆਹਿਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣੇ	ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।
ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ	ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਦੁਖਦਾਈ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ।
ਕੈਂਸਰ	ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਕ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।