

TACROLIMUS [TA-CRO-LI-MUS]




TACROLIMUS [TAK-ROW-LIM-US]

En Colombie-Britannique, quatre marques de tacrolimus sont disponibles pour les transplantés. Le tacrolimus est un médicament utilisé pour abaisser le système immunitaire de votre corps afin d'empêcher votre organe transplanté d'être rejeté.

- **Il est très important de garder une trace de la marque de tacrolimus que vous prenez. Ne changez pas de marque de tacrolimus à moins que votre équipe de transplantation n'ait discuté de ce changement avec vous. Au cas où vous auriez besoin d'aller à l'hôpital, apportez votre approvisionnement de médicaments à domicile avec vous.**




Prograf^{MD} - Tacrolimus pris DEUX FOIS par jour

Prograf[®] - tacrolimus taken TWICE a day

<p>Prograf 0,5 mg</p>  <p>(comprimé jaune clair)</p>	<p>Prograf 1 mg</p>  <p>(comprimé blanc)</p>	<p>Prograf 5 mg</p>  <p>(comprimé rose)</p>
--	--	--





Sandoz tacrolimus^{MD} – Tacrolimus pris DEUX FOIS par jour

Sandoz tacrolimus[®] – tacrolimus taken TWICE a day

<p>Sandoz tacrolimus 0,5 mg</p>  <p>(comprimé jaune clair)</p>	<p>Sandoz tacrolimus 1 mg</p>  <p>(comprimé blanc)</p>	<p>Sandoz tacrolimus 5 mg</p>  <p>(comprimé rose)</p>
--	--	--




Advagraf^{MD}- Tacrolimus à ACTION PROLONGÉE pris UNE FOIS par jour

Advagraf[®] – LONG ACTING tacrolimus taken ONCE a day

<p>Advagraf 0,5 mg</p>  <p>(comprimé orange et jaune clair)</p>	<p>Advagraf 1 mg</p>  <p>(comprimé orange et blanc)</p>	<p>Advagraf 3 mg</p>  <p>(comprimé orange et orange)</p>	<p>Advagraf 5 mg</p>  <p>(comprimé orange et rose)</p>
---	---	---	--

Envarsus PA^{MD} - Tacrolimus à ACTION PROLONGÉE pris UNE FOIS par jour

Envarsus PA[®] - LONG ACTING tacrolimus taken ONCE a day

<p>Envarsus PA 0,75 mg</p>  <p>(comprimé blanc)</p>	<p>Envarsus PA 1 mg</p>  <p>(comprimé blanc)</p>	<p>Envarsus PA 4 mg</p>  <p>(comprimé blanc)</p>
---	--	---

Comment faut-il prendre ce médicament?

How should I take this medication?

Il est important de prendre vos médicaments à la même heure chaque jour afin de garder une quantité constante (niveau de médicament) dans votre corps.

	Prograf : prenez ce médicament TOUTES les 12 HEURES (par exemple, 9 h et 21 h)	Heure(s) de prise du médicament : _____
	Sandoz tacrolimus : prenez ce médicament TOUTES les 12 HEURES (par exemple, 9 h et 21 h)	Heure(s) de prise du médicament : _____
	Advagraf : prenez ce médicament UNE FOIS par jour (par exemple 9 h)	Heure(s) de prise du médicament : _____
	Envarsus PA : prenez ce médicament UNE FOIS par jour (par exemple 9 h)	Heure(s) de prise du médicament : _____

- Le tacrolimus doit être pris **avec de la nourriture** pour diminuer les maux d'estomac, mais peut être pris à jeun si on le préfère. Soyez cohérent, si vous le prenez avec de la nourriture, prenez-le toujours avec de la nourriture; si vous le prenez à jeun, prenez-le toujours à jeun.
- Évitez le pamplemousse, le pomelo, l'orange de Séville ou leur jus pendant le traitement par ce médicament en raison d'une interaction grave.
- Si vous devez subir une intervention ou une opération qui vous oblige à ne rien manger avant (jeûne), vous **devez** prendre quand même vos médicaments pour la transplantation avec une gorgée d'eau à l'heure habituelle.

Rappelez-vous : si on vous demande de faire un dosage de tacrolimus, ne prenez PAS votre dose du matin avant votre prise de sang. Essayez de programmer vos analyses de sang à l'heure à laquelle vous devez prendre votre médicament. Apportez votre dose à la clinique ou au laboratoire pour pouvoir la prendre après l'analyse de sang.

Dose oubliée ou dose vomie :

Missed Dose or Vomited Dose:

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à l'heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.

Si vous avez **manqué plus d'un jour** de médicaments antirejet, contactez immédiatement votre équipe de transplantation pour obtenir des instructions supplémentaires.

Si vous vomissez dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament remonter, répétez la dose. Sinon, continuez avec votre prochaine dose.

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament?

What are some possible side effects of this medication?























Effets secondaires	Gestion
Tremblements, secousses, maux de tête, crises d'épilepsie	La présence de ces effets secondaires peut être le signe d'un taux élevé de tacrolimus. Signalez ces symptômes à votre médecin.
Hypertension artérielle	Vérifiez votre tension artérielle régulièrement. Vous pourriez avoir besoin de médicaments pour la tension artérielle. Évitez les aliments à haute teneur en sel ou sodium.

Hyperglycémie	La glycémie sera surveillée et un traitement pourrait être nécessaire en cas d'hyperglycémie. Signalez à votre médecin tout engourdissement ou picotement des mains ou des pieds, une augmentation de la soif, une bouche sèche, une odeur fruitée dans l'haleine ou une augmentation de la fréquence urinaire. Si vous êtes diabétique, veillez à surveiller régulièrement votre taux de glycémie et à prendre vos médicaments pour le diabète comme prescrit.
Brûlures d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée	Vérifiez auprès de votre médecin si ces symptômes sont dérangeants ou persistants.
Changements d'humeur, dépression, confusion, difficulté à dormir, rêves anormaux	Vérifiez auprès de votre médecin si ces symptômes sont dérangeants ou persistants.
Cheveux dégarnis ou perte de cheveux	Signalez ces symptômes à votre médecin.
La capacité de votre corps à faire face à une maladie ou à une blessure est affaiblie par le tacrolimus	Rapportez les signes d'infection (fièvre, frissons, rythme cardiaque rapide, rhume et grippe) à votre équipe de transplantation. Essayez d'éviter tout contact étroit avec les personnes qui ont des infections actives. Lavez-vous fréquemment les mains.
Diminution de la fonction rénale	Des taux élevés de tacrolimus peuvent diminuer votre fonction rénale. Vos taux de tacrolimus seront étroitement surveillés et la dose sera ajustée si nécessaire. Avisez votre médecin si vous remarquez des changements dans votre urine ou la quantité produite.
Niveau élevé de potassium	Votre taux de potassium sera surveillé. Signalez immédiatement à votre équipe de transplantation toute faiblesse musculaire, tout engourdissement des membres ou tout rythme cardiaque irrégulier.
Cancer	La prise de ce médicament peut augmenter votre risque de cancer de la peau et d'autres cancers. Veuillez informer votre équipe de transplantation si vous recevez un diagnostic de cancer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Risque de cancer ».

Carte pour portefeuille :

Wallet card:



 <h3>Tacrolimus à action prolongée</h3> <p>On vous a prescrit :</p> <p><input type="checkbox"/> Advagraf (tacrolimus)</p> <p><input type="checkbox"/> Envarsus PA (tacrolimus)</p> <ul style="list-style-type: none"> Il est très important que vous restiez sur la même marque de tacrolimus à action prolongée. Passer à une autre marque sans la supervision de votre clinique de transplantation pourrait entraîner un rejet d'organe ou une augmentation des effets secondaires. 	<p>Advagraf® – LONG ACTING tacrolimus taken ONCE a day</p> <table border="1"> <tr> <td> Advagraf 0.5 mg (orange- light yellow capsule)</td> <td> Advagraf 1 mg (orange- white capsule)</td> <td> Advagraf 3 mg (orange- orange capsule)</td> <td> Advagraf 5 mg (orange- pink capsule)</td> </tr> </table> <p>Envarsus PA® - LONG ACTING tacrolimus taken ONCE a day</p> <table border="1"> <tr> <td> Envarsus PA 0.75 mg (white tablet)</td> <td> Envarsus PA 1 mg (white tablet)</td> <td> Envarsus PA 4 mg (white tablet)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez toujours cette carte sur vous et montrez-la à toute personne impliquée dans vos soins médicaux (médecin, personnel infirmier, pharmacien). • N'arrêtez pas de prendre vos médicaments pour la transplantation à moins que votre clinique de transplantation ne vous dise de le faire. • N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin ou au personnel infirmier au sujet de vos médicaments. 	 Advagraf 0.5 mg (orange- light yellow capsule)	 Advagraf 1 mg (orange- white capsule)	 Advagraf 3 mg (orange- orange capsule)	 Advagraf 5 mg (orange- pink capsule)	 Envarsus PA 0.75 mg (white tablet)	 Envarsus PA 1 mg (white tablet)	 Envarsus PA 4 mg (white tablet)
 Advagraf 0.5 mg (orange- light yellow capsule)	 Advagraf 1 mg (orange- white capsule)	 Advagraf 3 mg (orange- orange capsule)	 Advagraf 5 mg (orange- pink capsule)					
 Envarsus PA 0.75 mg (white tablet)	 Envarsus PA 1 mg (white tablet)	 Envarsus PA 4 mg (white tablet)						

