

داپزون DAPSONE

- این دارو به صورت قرص خوراکی موجود است و در صورت لزوم به صورت مایع مخصوص ساخته می‌شود.
- BC Transplant این دارو را تامین نمی‌کند و بنا به انتخاب خودتان در داروخانه قابل خریداری است.

ظاهر دارو به چه شکلی است؟ What does the medication look like?

مارک‌های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک داروی خود را در بخش زیر مشاهده نکنید. لطفاً در صورت داشتن هر گونه سؤالی با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.



موارد مصرف این دارو چیست؟ What is this medication for?

Dapsone برای پیشگیری یا درمان یک نوع خاصی از ذات‌الریه (عفونت ریه)، معروف به PCP یا PJP استفاده می‌شود. این نوع عفونت در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند (به عنوان مثال پس از پیوند عضو) شایع‌تر است. Dapsone زمانی استفاده می‌شود که فرد به سولفا حساسیت داشته باشد یا دچار عوارض جانبی sulfamethoxazole/trimethoprim شده باشد.

این دارو را باید چگونه مصرف کرد؟ How should I take this medication?

این دارو را سه بار در هفته مصرف کنید (مثلاً 9 صبح)	زمان و روزهای مصرف داروی شما:
---	-------------------------------

- این دارو با یا بدون غذا قابل مصرف است.
- می‌توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با داروهای دیگر قابل مصرف است.

دوز فراموش شده یا بالا آورده شده: Missed Dose or Vomited Dose:

اگر یک نوبت دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان مقرر مصرف کنید. اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید. داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.

اگر ظرف 30 دقیقه پس از مصرف دارو استفراغ کردید یا مشاهده کردید که مقداری از دارو بالا آمده است، مصرف دارو را تکرار کنید. در غیر این صورت، مصرف داروی خود را فقط طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید.

برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication?

کنترل	عوارض جانبی
در روزهای آفتابی در بیرون از خانه کلاه، لباس آستین بلند و شلوار یا دامن بلند بپوشید. از لوسیون ضد آفتاب با SPF (عامل محافظت در برابر آفتاب) حداقل 30 استفاده کنید.	حساسیت به آفتاب
آزمایش خون منظم برای بررسی تعداد سلول‌های خونی شما انجام شود. در صورت داشتن موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:	Dapsone ممکن است تعداد گلبول‌های سفید و قرمز خون شما را کاهش دهد.
<ul style="list-style-type: none"> • نشانه‌ها یا علائم عفونت (تب یا لرز، سرفه، گلودرد یا درد یا مشکل در دفع ادرار) • علائم کاهش گلبول‌های قرمز خون (ضعف یا خستگی، غش کردن، سبکی سر) 	ممکن است ریسک عفونت و خونریزی شما بالا برود
در اسرع وقت به پزشک یا تیم پیوند خود اطلاع دهید	بثورات پوستی یا خارش