

DAPSONE

DAPSONE

- Ce médicament est disponible sous forme de comprimé oral et d'un liquide spécial si nécessaire.
- Ce médicament n'est pas financé par BC Transplant et peut être acheté à la pharmacie de votre choix.

À quoi ressemble le médicament?

What does the medication look like?

Il existe plusieurs marques pour ce médicament et il se peut que la vôtre ne soit pas exactement représentée ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre pharmacien spécialisé en transplantation.



À quoi sert ce médicament?

What is this medication for?

La dapsoné est utilisée pour prévenir ou traiter un type particulier de pneumonie (infection pulmonaire) connu sous le nom de PPC ou PPJ. Ce type d'infection est plus fréquent chez les patients dont le système immunitaire est affaibli (par exemple après une transplantation d'organe). La dapsoné est utilisée lorsqu'une personne est allergique aux sulfates ou a des effets secondaires au sulfaméthoxazole ou triméthoprime.

Comment faut-il prendre ce médicament?

How should I take this medication?

Prenez ce médicament **trois fois par semaine**
(par exemple 9 h)

Heure(s) et jour(s) de prise du médicament :

- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Il peut être pris à tout moment de la journée et peut être pris en même temps que vos autres médicaments.

Dose oubliée ou dose vomie :

Missed Dose or Vomited Dose:

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à l'heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.

Si vous vomissez dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament remonter, répétez la dose. Sinon, continuez avec votre prochaine dose.

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament?

What are some possible side effects of this medication?

<i>Effets secondaires</i>	<i>Gestion</i>
<i>Hypersensibilité au soleil</i>	Portez un chapeau, des manches longues et un pantalon ou une jupe longue à l'extérieur les jours ensoleillés. Appliquez une lotion solaire avec un FPS (facteur de protection solaire) d'au moins 30.
<i>La dapsonne peut réduire le nombre de vos globules blancs et rouges.</i> <i>Vous pourriez présenter un risque accru d'infection et de saignement.</i>	Des analyses sanguines régulières seront effectuées pour vérifier vos numérations sanguines. Appelez votre médecin si vous remarquez un des signes suivants : <ul style="list-style-type: none"> • signes ou symptômes d'infection (fièvre ou frissons, toux, maux de gorge ou douleurs ou difficultés à uriner); • signes de diminution du nombre de globules rouges (faiblesse ou fatigue, évanouissements, vertiges).
<i>Éruption cutanée ou urticaire.</i>	Prévenez votre médecin ou votre équipe de transplantation dès que possible