

डैप्सोन (DAPSONE)

- यह दवा खाने वाली गोली और यदि ज़रूरी हो, तो विशेष रूप से तैयार की गई पीने वाली दवा के रूप में उपलब्ध है।
- इस दवा के लिए BC ट्रांसप्लांट द्वारा फ़ंड नहीं दिए जाते और इसे अपनी पसंद की फार्मसी से ख़रीदा जा सकता है।

यह दवा कैसी दिखती है?(What does the medication look like?)

इस दवा के लिए कई ब्रांड हैं और हो सकता है कि आपको नीचे दिखाए गए ब्रांड जैसा अपना ब्रांड न मिले। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने ट्रांसप्लांट फार्मासिस्ट से संपर्क करें।



यह दवा किस बीमारी के लिए है? (What is this medication for?)

PCP या PJP के नाम से जाने जाते एक विशेष प्रकार के निमोनिया (फेफड़ों का संक्रमण) की रोकथाम या उसका इलाज करने के लिए डैप्सोन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का संक्रमण कमज़ोर प्रतिरक्षा-प्रणाली वाले रोगियों में अधिक होता है (उदाहरण के लिए एक अंग के ट्रांसप्लांट के बाद)। किसी व्यक्ति को सल्फ़ा एलर्जी होने या सल्फ़ामैथोक्साज़ोल/ट्राइमथोप्रिम के दुष्प्रभाव महसूस होने पर डैप्सोन का उपयोग किया जाता है।

मुझे यह दवा कैसे लेनी चाहिए? (How should I take this medication?)

यह दवा हफ़्ते में तीन बार लें
(उदाहरण के लिए सुबह 9 बजे)

आपकी दवा के समय और हफ़्ते के दिन:

- यह दवा भोजन के साथ या बिना भोजन के ली जा सकती है।
- यह दवा दिन में किसी भी समय ली जा सकती है और आप इसे अपनी किसी भी अन्य दवाओं के समय पर ले सकते हैं।

छूटी हुई खुराक या उलटी द्वारा निकली खुराक (Missed Dose or Vomited Dose):

यदि आपसे खुराक छूट गई है, जैसे ही आपको याद आए, अपनी दवा लें और फिर अपनी अगली खुराक नियमित तौर पर निर्धारित समय पर लें। यदि आपकी अगली खुराक लेने में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो अपनी छूटी हुई खुराक न लें और अपने नियमित समय पर खुराक लेना जारी रखें। दोगुनी या अतिरिक्त खुराक न लें।

यदि खुराक लेने के 30 मिनट के भीतर आपको उल्टी हो जाती है या यदि आप देखते हैं कि कोई दवा बाहर निकली है, तो खुराक दोबारा लें। नहीं तो, बस अपने अगले निर्धारित समय पर खुराक लें।

इस दवा के कुछ संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं? (What are some possible side effects of this medication?)

दुष्प्रभाव	प्रबंधन
धूप से संवेदनशीलता	तेज़ धूप वाले दिनों में बाहर निकलते समय हैट, पूरी बाजू वाली कमीज़ और लंबी पैंट या स्कर्ट पहनें। कम से कम 30 SPF (धूप से बचाव-कारक) के साथ धूप से बचाव करने वाला लोशन लगाएं।
डैप्सोन आपके खून की सफेद और लाल कोशिकाओं की संख्या कम कर सकती है। आप संक्रमण और खून निकलने के बड़े हुए जोखिम पर हो सकते हैं।	अपने लाल खून की कोशिका की संख्या का पता लगाने के लिए खून की आम नियमित जांच की जाएगी। यदि आपको इनमें से कोई है, तो अपने डॉक्टर से पता लगाएं: <ul style="list-style-type: none"> • संक्रमण के संकेत या लक्षण (बुखार या कंपकंपी, खांसी, गले में खराश या दर्द या पेशाब करने में कठिनाई) • खून की लाल कोशिकाएं घटने के संकेत (कमज़ोरी या थकान, थोड़े समय के लिए अचेत होना, चक्कर आना) • खून की लाल कोशिकाएं घटने के संकेत (कमज़ोरी या थकान, थोड़े समय के लिए अचेत होना, चक्कर आना)
त्वचा पर लाल चकते या खारिश	जल्द से जल्द अपने डॉक्टर या ट्रांसप्लांट टीम को बताएं