

氨苯砒 DAPSONE

- 该药物剂型为口服片剂，如有需要，可特制药液使用。
- 该药物不受 BC Transplant 资助，可在您选择的药房购买。

这种药物外观是什么样的？ What does the medication look like?

这种药物有多个品牌，以下所列药物可能看起来与您的不完全相同。如有任何疑问，请咨询移植药剂师。



这种药物的用途是什么？ What is this medication for?

氨苯砒用于预防或治疗特定类型的肺炎（肺部感染），称为“PCP”或“PJP”。该类型的感染在免疫系统薄弱的患者中更为常见（例如器官移植后）。当个体对磺胺类药物过敏或对磺胺甲恶唑/甲氧苄啶出现副作用时，使用氨苯砒。

我应该如何使用这种药物？ How should I take this medication?

<p>该药物每周服用 3 次 (例如上午 9 点)</p>	<p>您每周的周几服药和服药时间： _____</p>
-----------------------------------	---------------------------------

- 该药物可以与食物同服，也可单独服用。
- 可在一天中的任何时间服用该药物，也可以与您的任何其他药物共同服用。

漏服药物或吐出药物： Missed Dose or Vomited Dose:

若您漏服药物，请在记起后尽快服用，并按照规定时间服用下一剂药物。若距离您服用下一剂药物的时间已过一半，则跳过漏服的剂量并继续按平时的时间服用下一剂。不要一次服用双倍剂量或额外剂量。

若您在服用药物后 30 分钟内呕吐，或在呕吐物中发现部分药物，请再次服药。否则，请继续按时服用下一剂药物。

这种药物可能的副作用有哪些？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理
光敏性	在晴天佩戴帽子、穿着长袖、长裤或长裙。涂抹 SPF（防晒系数）至少为 30 的防晒霜。
<p>氟康唑可降低白细胞和红细胞数量。</p> <p>您受到感染和出血的风险将上升。</p>	<p>接受常规血液检查以了解您的血细胞数量。</p> <p>若您出现以下任何情况，请咨询医生：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 感染的征象或症状（发热或寒颤、咳嗽、喉咙疼痛或排尿困难） • 红细胞减少征象（疲乏倦怠、昏厥、头晕）
皮疹或瘙痒	请尽快告知医生或移植团队