

氨苯砒 DAPSONE

- 此藥物為一種口服藥片，需要時可特別配製成液劑。
- 此藥不是卑詩省移植協會的資助藥物，病人可以在自己選定的藥房購買。

藥物外型是怎樣的？What does the medication look like?

這種藥物有幾個牌子，您的藥物可能跟下圖的不盡相同。若有任何疑問，請向您的移植藥劑師查詢。



此藥用來醫治什麼？What is this medication for?

氨苯砒是用來預防或治療一種名為 PCP 或 PJP 的肺炎，這種肺炎較常見於免疫力下降（例如做完器官移植）的病人。當病人出現磺胺過敏，或對撲菌特錠 (sulfamethoxazole/trimethoprim) 產生副作用時，便需使用氨苯砒治理。

應如何服用此藥？How should I take this medication?

此藥物是一星期服用三次 (例如早上 9 時)	您在一星期中哪些日子和時間服藥： _____
---------------------------	---------------------------

- 此藥物可以隨餐或空腹服用。
- 可以在一天中任何時間服用，也可以跟您的其他任何藥物同時服用。

漏服藥物或嘔吐藥物：Missed Dose or Vomited Dose:

若漏服了一劑藥物，在記起後即盡快補服，然後按照下次的原定服藥時間服藥。若離下次服藥時間已過了一半時間，則不用補服，只需繼續按原定時間服藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若在服藥後 30 分鐘內嘔吐，或在嘔吐物中看見藥物，便須再次服藥，否則只需繼續等至下次服藥時間才服下一劑。

此藥可能有什麼副作用？What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
對太陽敏感	在晴朗的日子戴上帽子、穿上長袖衫及長褲或長裙。塗上防曬指數 (SPF) 達 30 或以上的防曬油。
<p>氨苯福可降低白血球和紅血球數量。</p> <p>受感染和流血的風險可能提高。</p>	<p>定期驗血檢查各項血液細胞指數。</p> <p>若出現以下任何情況，須通知您的醫生：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 感染跡象或症狀 (發燒或發冷、咳嗽、喉嚨痛、小便疼痛或排尿困難) • 紅血球下降的跡象 (感到虛弱或疲倦、短暫暈眩、頭暈)
皮膚出疹或痕癢	盡快通知您的醫生或移植團隊。