

فلوکونازول FLUCONAZOLE

- ◀ با نام تجاری Diflucan® نیز شناخته می‌شود
- ◀ این دارو به صورت قرص خوراکی 50 میلی‌گرم، 100 میلی‌گرم، 150 میلی‌گرم، 200 میلی‌گرم یا مایع خوراکی یا به صورت تزریق درون‌وریدی موجود است.
- ◀ BC Transplant این دارو را تامین نمی‌کند و در داروخانه مورد انتخاب خودتان قابل خریداری است.

ظاهر دارو به چه شکل است*؟ **What does the medication look like*?** مارک‌های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک خود را در میان مارک‌های زیر نبینید. لطفاً اگر سؤالی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.

قرص Fluconazole در اندازه 150 میلی‌گرم 	قرص Fluconazole در اندازه 100 میلی‌گرم 	قرص Fluconazole در اندازه 50 میلی‌گرم 
---	---	--

موارد مصرف این دارو چیست؟ **What is this medication for?** Fluconazole یک داروی ضدقارچ است که برای درمان برخی از ارگاناسم‌های قارچی استفاده می‌شود.

این دارو را باید چگونه مصرف کنم؟ **How should I take this medication?**

این دارو را روزی یکبار مصرف کنید (به عنوان مثال 9 صبح)	زمان‌های مصرف داروی شما:
---	--------------------------

- این دارو با غذا یا بدون غذا قابل مصرف است.
- می‌توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با سایر داروهایتان قابل مصرف است. دارو را هر روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار (سطح دارو) در بدن شما ثابت بماند.
- اگر نسخه‌ای برای این دارو از سایر ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی دریافت کردید، تیم پیوند را مطلع کنید. این دارو با داروهای ضد پس زدن شما تداخل خواهد داشت.

نوبت فراموش شده یا قی شده: Missed Dose or Vomited Dose:

اگر یک نوبت دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان مقرر مصرف کنید. اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید. داروی خود را دوبرابر نکنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.

اگر ظرف 30 دقیقه پس از مصرف دارو استفراغ کردید یا مشاهده کردید که مقداری از دارو بالا آمده است، مصرف دارو را تکرار کنید. در غیر این صورت، مصرف داروی خود را فقط طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید.

برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication?

کنترل	عوارض جانبی
همراه با غذا یا شیر مصرف شود.	ناراحتی معده، حالت تهوع
قابل برطرف شدن است، اما در صورت تداوم علائم به پزشک خود اطلاع دهید.	اسهال
قابل رفع شدن است؛ ممکن است پزشک شما یک مسکن بدون نسخه پیشنهاد کند.	سردرد
در صورت تجربه هر یک از موارد زیر فوراً پزشک خود را مطلع کنید: پوست یا چشم زردرنگ، درد معده یا شکم، ادرار تیره یا مدفوع کمرنگ.	عملکرد غیرعادی کبد