

## FLUCONAZOLE

## FLUCONAZOLE

- Aussi connu sous le nom de Diflucan<sup>MD</sup>
- Ce médicament est disponible sous forme de comprimé oral de 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg ou de liquide oral ou sous forme d'injection intraveineuse.
- Ce médicament n'est pas financé par BC Transplant et peut être acheté à la pharmacie de votre choix.

### À quoi ressemble le médicament?\*

### What does the medication look like\*?

Il existe plusieurs marques pour ce médicament et il se peut que la vôtre ne soit pas exactement représentée ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre pharmacien spécialisé en transplantation.

<p>Comprimé de fluconazole de 50 mg</p> 	<p>Comprimé de fluconazole de 100 mg</p> 	<p>Comprimé de fluconazole de 150 mg</p> 
---	--	--

### À quoi sert ce médicament?

### What is this medication for?

Le fluconazole est un médicament antifongique utilisé pour traiter certains organismes fongiques.

### Comment faut-il prendre ce médicament?

### How should I take this medication?

<p>Prenez ce médicament une fois par jour (par exemple 9 h)</p>	<p>Heure(s) de prise du médicament :</p> <hr/>
---	--

- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Il peut être pris à tout moment de la journée et peut être pris en même temps que vos autres médicaments. Prenez-le tous les jours à la même heure de la journée afin de maintenir une quantité constante (niveau de médicament) dans votre corps.
- **Informez l'équipe de transplantation si vous recevez une ordonnance pour ce médicament de vos autres fournisseurs de soins de santé. Il interagira avec vos médicaments antirejet.**

## Dose oubliée ou dose vomie :

### Missed Dose or Vomited Dose:

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à l'heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.

Si vous vomissez dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament remonter, répétez la dose. Sinon, continuez avec votre prochaine dose.

## Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament?

### What are some possible side effects of this medication?

<i>Effets secondaires</i>	<b>Gestion</b>
<i>Maux d'estomac, nausées</i>	Prenez ce médicament avec de la nourriture ou du lait.
<i>Diarrhée</i>	Peut se résorber, mais informez votre médecin si les symptômes sont persistants.
<i>Mal de tête</i>	Peut se résorber; votre médecin peut vous suggérer un analgésique en vente libre.
<i>Fonction anormale du foie</i>	Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants : peau ou yeux de couleur jaune, douleurs abdominales ou abdominales, urine foncée ou selles pâles.