

氟康唑 FLUCONAZOLE

- 又名 Diflucan®（大扶康）
- 该药物的剂型为不同规格的口服片剂，包括 50 毫克、100 毫克、150 毫克、200 毫克或是口服液或静脉注射液。
- 该药物不受 BC Transplant 资助，可在您选择的药房购买。

这种药物外观是什么样的*？ What does the medication look like*？

这种药物有多个品牌，以下所列药物可能看起来与您的不完全相同。若有任何疑问，请咨询移植药剂师。

氟康唑 50 mg，片剂 	氟康唑 100 mg，片剂 	氟康唑 150 mg，片剂 
---	--	--

这种药物的用途是什么？ What is this medication for？

氟康唑是一种抗真菌药物，用于治疗部分真菌。

我应该如何使用这种药物？ How should I take this medication？

该药物每天服用一次 (例如每天上午 9 点)	您的用药时间： _____
---------------------------	------------------

- 该药物可以与食物同服，也可单独服用。
- 可在一天中的任何时间服用该药物，也可以与您的任何其他药物共同服用。在每天固定时间服用药物，以保持药物在您体内数量（药物浓度）的稳定。
- 如果您从其他医疗保健提供者处得到该药处方，请通知移植团队。该药物将会与抗排斥药物互相作用。

漏服药物或吐出药物： Missed Dose or Vomited Dose:

若您漏服药物，请在记起后尽快服用，并按照规定时间服用下一剂药物。若距离您服用下一剂药物的时间已过一半，则跳过漏服的剂量并继续按平时的时间服用下一剂。不要一次服用双倍剂量或额外剂量。

若您在服用药物后 30 分钟内呕吐，或在呕吐物中发现部分药物，请再次服药。否则，请继续按时服用下一剂药物。

这种药物可能的副作用有哪些？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理
胃部不适、恶心	与食物或牛奶同服。
腹泻	可能会缓解消失，但如果症状持续存在，请告知您的医生。
头痛	可能会缓解消失；您的医生可能会建议使用非处方止痛药。
肝功能异常	如果出现以下任何一种情况，请立即通知您的医生：皮肤或眼睛黄疸、胃痛或腹痛、尿液呈黑色或粪便呈淡色。