

氟康唑 FLUCONAZOLE

- 又名 Diflucan®
- 此藥物提供 50 毫克、100 毫克、150 毫克、200 毫克的口服藥片或口服液或靜脈注射劑。
- 此藥不是卑詩省移植協會的資助藥物，病人可以在自己選定的藥房購買。

藥物外型是怎樣的？What does the medication look like*?

這種藥物有幾個牌子，您的藥物可能跟下圖的不盡相同。若有任何疑問，請向您的移植藥劑師查詢。



此藥用來醫治什麼？What is this medication for?

氟康唑是一種抗真菌藥物，用來治療某些真菌微生物。

應如何服用此藥？How should I take this medication?

<p>此藥每天服用一次 (例如早上 9 時)</p>	<p>服藥時間：</p> <hr/>
--------------------------------	--------------------

- 此藥物可以隨餐或空腹服用。
- 可以在一天中任何時間服用，也可以跟您的其他任何藥物同時服用。每天都必須在相同時間服藥，令體內保持穩定的藥量水平，這是非常重要的。
- 若其他醫護人員為您開出此處方藥物，請通知移植團隊，因為此藥將跟您的抗排斥藥產生相互作用。

漏服藥物或嘔吐藥物：Missed Dose or Vomited Dose:

若漏服了一劑藥物，在記起後即盡快補服，然後按照下次的原定服藥時間服藥。若離下次服藥時間已過了一半時間，則不用補服，只需繼續按原定時間服藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若在服藥後 30 分鐘內嘔吐，或在嘔吐物中看見藥物，便須再次服藥，否則只需繼續等至下次服藥時間才服下一劑。

此藥可能有什麼副作用？**What are some possible side effects of this medication?**

副作用	管理方法
胃部不適、噁心	以食物或牛奶送服。
肚瀉	可能自行減退，但若症狀持續不退，須通知醫生。
頭痛	可能自行減退；您的醫生可能建議您服用非處方止痛藥。
肝功能異常	若出現以下任何一個症狀，須立即通知您的醫生：皮膚或眼睛泛黃、出現胃痛或腹痛、深色尿液或灰白色大便。