

拉米夫定 LAMIVUDINE

- 又名 Heptovir®、Apo-lamivudine®
- 该药物剂型为口服片剂或溶液。

这种药物外观是什么样的？ What does the medication look like?

这种药物有多个品牌，以下所列药物可能看起来与您的不完全相同。若有任何疑问，请咨询移植药剂师。



这种药物的用途是什么？ What is this medication for?

拉米夫定可降低血液中的乙肝病毒数量，可帮助改善肝功能并减少未来的肝脏损伤。

我应该如何使用这种药物？ How should I take this medication?

该药物每天服用一次 (例如每天上午 9 点)	您的服药时间： _____
---------------------------	------------------

- 该药物可以与食物同服，也可单独服用。
- 可在一天中的任何时间服用该药物，也可以与您的任何其他药物共同服用。在每天固定时间服用药物，以保持药物在您体内数量（药物浓度）的稳定。

漏服药物或吐出药物： Missed Dose or Vomited Dose:

若您漏服药物，请在记起后尽快服用，并按照规定时间服用下一剂药物。若距离您服用下一剂药物的时间已过一半，则跳过漏服剂量并继续按平时的时间服用下一剂。不要一次服用双倍剂量或额外剂量。

若您在服用药物后 30 分钟内呕吐，或在呕吐物中发现部分药物，请再次服药。 否则，请继续按时服用下一剂药物。

这种药物可能的副作用有哪些？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理
腹泻、恶心、呕吐、头痛、疲乏	与食物或牛奶同服。若副作用持续存在，请告知医生或移植团队。
手部和脚部的灼烧感/麻刺感	若副作用未消失或恶化，请告知医生。
耳部、鼻部或咽喉感染	发热，耳部和下巴疼痛，咀嚼食物时疼痛，鼻部分泌物不透明。若副作用持续存在，请告知医生。
肝功能异常	若您有以下症状，请告知医生： <ul style="list-style-type: none"> ● 严重腹痛并伴有恶心或呕吐 ● 皮肤或眼部黄疸，胃痛或腹痛、尿液呈黑色或粪便呈淡色 ● 身体外形上无法解释的变化（腰部和/或面部肥胖） ● 手部或脚部疼痛、麻刺感或麻木感