


ليتيرموفير LETERMOVIR

- ← يعرف كذلك باسم بريفييميس®
- ← يتوفر هذا الدواء في شكل قرص فموي.

كيف يبدو شكل الدواء؟

What does the medication look like?



لماذا يستخدم هذا الدواء؟

What is this medication for?

هذا دواء مضاد للفيروسات. وفي حالة المرضى الذين يعانون من جهاز مناعي ضعيف (على سبيل المثال بعد زراعة عضو)، يستخدم لمنع الإصابة بعدوى فيروسية تسمى CMV (الفيروس المضخم للخلايا) إذا لم ينجح الدواء المضاد للفيروسات العادي، فالجانسيكلوفير، في حل الأمر أو إذا كان شخص يعاني من آثار جانبية لدواء فالجانسيكلوفير.

كيف يجب أن أتناول هذا الدواء؟

How should I take this medication?

تناول هذا الدواء مرة يوميًا (على سبيل المثال ٩ صباحًا)	وقت الدواء: _____
---	-------------------

- يمكن تناول هذا الدواء إما مع الطعام أو من دونه.
- يمكن تناوله في أي وقت من اليوم وربما تناوله في نفس الوقت مثل الأدوية الأخرى. ويجب تناوله في نفس الوقت من اليوم يوميًا للحفاظ على وجود كمية ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.
- قد يتفاعل مع الأدوية الأخرى. أخبر فريق زراعة الأعضاء بشأن الأدوية الأخرى (المنتجات العشبية أو الأدوية من دون وصفة طبية)، بما في ذلك الأدوية التي وصفها مقدمو الرعاية الصحية الآخرون.

تفويت جرعة أو تقيؤ جرعة:

Missed Dose or Vomited Dose:

إذا فاتك تناول أي جرعة، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالية في موعدا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر من نصف الوقت الذي يفصلك عن تناول جرعتك التالية، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالية في موعدا المعتاد. لا تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافية.

إذا تقيأت خلال ٣٠ دقيقة من تناول الجرعة أو إذا رأيت بعض من الدواء يخرج من معدتك، فكرر الجرعة. وإلا، فتابع تناول الجرعات حسب مواعيدها المعتادة.

ما هي بعض الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء؟

What are some possible side effects of this medication?

الآثار الجانبية	السيطرة عليه
صداع	قد تتوقف الأعراض؛ قد يقترح طبيبك استخدام مسكن للألم دون وصفة طبية.
غثيان، قيء، إسهال	تناول الدواء مع الطعام. تواصل مع طبيبك إذا استمرت الأعراض أو كانت مزعجة.
تورم	قد تتوقف؛ تواصل مع طبيبك إذا استمرت الأعراض أو كانت مزعجة.