

滅巨斯膜衣錠 LETERMОВIR

- 又名 Prevymis®
- 此藥為口服藥片。

藥物外型是怎樣的？ What does the medication look like?

滅巨斯膜衣錠 480 毫克藥片



此藥用來醫治什麼？ What is this medication for?

這是一種抗病毒藥物。對於免疫系統減弱（例如做完器官移植）的病人，此藥是用來預防一種名為 CMV 病毒（巨細胞病毒）的感染。若病人在用了常用的克毒愈膜衣錠 (valganciclovir) 抗病毒藥後無效或出現副作用，便會轉用此藥。

應如何服用此藥？ How should I take this medication?

此藥每天服用一次
(例如早上 9 時)

您的服藥時間：

- 此藥可以隨餐或空腹服用。
- 可以在一天中任何時間服用，也可以跟您的其他任何藥物同時服用。每天都在相同的時間服藥，令體內保持穩定的藥量水平。
- 它或會與其他藥物產生相互作用。請通知移植團隊您正在服用什麼其他藥物（非處方藥物或草本產品），包括由其他醫護人員開出的藥物。

漏服藥物或嘔吐藥物：Missed Dose or Vomited Dose:

若漏服了一劑藥物，在記起後即盡快補服，然後按照下次的原定服藥時間服藥。若離下次服藥時間已過了一半時間，則不用補服，只需繼續按原定時間服藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若在服藥後 30 分鐘內嘔吐，或在嘔吐物中看見藥物，便須再次服藥，否則只需繼續等至下次服藥時間才服下一劑。

此藥可能有什麼副作用？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
頭痛	可能自行減退；您的醫生可能建議您服用非處方止痛藥。
噁心、嘔吐、肚瀉	以食物送服。若症狀持續不退或對您造成困擾，須通知您的醫生。
腫脹	可能自行減退；若症狀持續不退或對您造成困擾，須通知您的醫生。