

## بينتاميدين PENTAMIDINE

- يعطى هذا الدواء عن طريق التنفس (الاستنشاق) عبر بخاخة (جهاز يغير الدواء من صورته السائلة إلى رذاذ) في عيادة أو مستشفى. وقد يعطى كذلك في صورة حقن في الوريد.
- لا تمول BC Transplant هذا الدواء ويمكن شراؤه من أي صيدلية تفضلها.

### كيف يبدو شكل الدواء؟

What does the medication look like?



### لماذا يستخدم هذا الدواء؟

What is this medication for?

يستخدم بينتاميدين لمنع أو علاج نوع معين من الالتهاب الرئوي المعروف باسم الالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية (PCP) أو الالتهاب الرئوي الجيروفيسي (PJP). ويشيع هذا النوع من الأمراض بكثرة بين المرضى الذين يعانون من جهاز مناعي ضعيف (على سبيل المثال بعد زراعة عضو). ويستخدم رذاذ (بخاخة) بينتاميدين عندما يكون الشخص لديه أُرْجِيَّة/حساسية من السلفا أو قد عانى من آثار جانبية بسبب دواء سلفاميثوكسازول/تريميثوبريم.

### كيف يجب أن أتناول هذا الدواء؟

How should I take this medication?

يعطى بينتاميدين عن طريق البخاخة مرة شهرياً	أوقات الدواء: _____
--	---------------------

- يتم إعطاء بينتاميدين في المستشفى، في غرفة مخصصة داخل مختبر وظائف الرئة.
- يتم استنشاق بينتاميدين مرة شهرياً. وسيقوم الطبيب المتابع لحالتك بتحديد المدة التي ستتناول خلالها هذا الدواء.

### ما هي بعض الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء؟

What are some possible side effects of this medication?

السيطرة عليه	الأثر الجانبي
سيتم إعطاؤك دواء آخر (سالبوتامول، فنتولين®) لاستنشاقه قبل بينتاميدين لتقليل تلك الأعراض.	ألم في الصدر أو سعال أو أزيز
هذا أمر مؤقت وينتهي بعد مرور يومين.	نقص الشهية
تنفس ببطء؛ وأوقف بينتاميدين إذا استلزم الأمر.	دوار/إرهاق/تعب
استخدم أقراص الاستحلاب للحلق أو شراب السعال إذا كانت الأعراض مزعجة للغاية.	سعال وألم في الحلق
اشطف الفم على الفور بعد العلاج بدواء بينتاميدين. وإذا حدث ذلك أثناء العلاج، يمكنك إيقاف الاستنشاق وتناول الماء.	مذاق مر أو معدني في الفم