

PENTAMIDINE پنتامیدین

- این دارو در کلینیک یا بیمارستان از طریق استنشاق (نفس کشیدن) بوسیله نبولایزر (دستگاهی که دارو را از مایع به ذرات بسیار ریز تبدیل می‌کند) داده می‌شود. همچنین ممکن است به صورت تزریق به داخل رگ نیز تجویز شود.
- BC Transplant این دارو را تامین نمی‌کند و در داروخانه مورد انتخاب خودتان قابل خریداری است.

ظاهر دارو به چه شکل است؟ What does the medication look like?

ویال 300 میلی‌گرمی Pentamidine (برای نبولیزه کردن)



موارد مصرف این دارو چیست؟ What is this medication for?

Pentamidine برای پیشگیری یا درمان نوع خاصی از ذات‌الریه (عفونت ریه) معروف به PCP یا PJP استفاده می‌شود. این نوع عفونت در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند (به عنوان مثال پس از عمل پیوند عضو) شایع‌تر است. Pentamidine نبولیزه شده (تبخیر شده) زمانی استفاده می‌شود که فرد حساسیت به سولفا داشته باشد یا عوارض جانبی sulfamethoxazole/trimethoprim در او بروز کرده باشد.

این دارو را باید چگونه مصرف کرد؟ How should I take this medication?

Pentamidine ماهی یکبار توسط نبولایزر مصرف می‌شود	زمان‌های مصرف داروی شما:
--	--------------------------

- Pentamidine در محیط بیمارستان، در یک اتاق مختص در آزمایشگاه عملکرد ریوی به بیمار داده می‌شود.
- استنشاق Pentamidine یک بار در ماه انجام می‌شود. پزشک مدت زمان نیاز شما به این دارو را تعیین خواهد کرد.

برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication?

عوارض جانبی	کنترل
درد قفسه سینه، سرفه یا خس خس سینه	به شما داروی دیگری (salbutamol با نام تجاری Ventolin®) داده می‌شود تا قبل از pentamidine نفس بکشید تا این مورد کاهش یابد.
کاهش اشتها	این مورد موقتی است و پس از چند روز از بین می‌رود.
سرگیجه/خستگی/کوفتگی	به آرامی نفس بکشید؛ در صورت لزوم pentamidine را قطع کنید.
سرفه و گلودرد	اگر علائم بسیار آزاردهنده هستند، از قرص‌های گلو یا شربت سرفه استفاده کنید.
طعم تلخ یا طعم فلز در دهان	بلافاصله پس از درمان با pentamidine، دهان را بشویید. اگر این مورد در طول درمان رخ داد، می‌توانید روند استنشاق را متوقف کرده و قدری آب بنوشید.