

噴他脒 PENTAMIDINE

- 在診所或醫院內以噴霧器（將液態藥物轉化成霧氣的裝置）吸藥，也可以透過靜脈注射施藥。
- 此藥不是卑詩省移植協會的資助藥物，病人可以在自己選定的藥房購買。

藥物外型是怎樣的？ What does the medication look like?



此藥用來醫治什麼？ What is this medication for?

噴他脒是用來預防或治療一種名為 PCP 或 PJP 的肺炎，這種肺炎較常見於免疫力下降（例如器官移植後）的病人。若病人對磺胺過敏，或曾對撲菌特錠(sulfamethoxazole/trimethoprim)有副作用，便需使用噴霧式（氣化）噴他脒治理。

應如何服用此藥？ How should I take this medication?

噴他脒是經由噴霧機每月吸藥一次

您的吸藥時間： _____

- 噴他脒治療是在醫院內肺功能化驗室的一間指定房間內進行。
- 噴他脒吸入治療每月一次。您的醫生決定您需要使用此藥多久。

此藥可能有什麼副作用？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
胸口痛、咳嗽或呼吸喘鳴	先吸另一種藥物（沙丁胺醇 salbutamol、喘樂寧 Ventolin®），才吸入噴他脒，可減輕此等症狀。
食慾下降	這是暫時性的，兩三天後便會消失。
頭暈 / 疲勞 / 怠倦	慢慢呼吸；需要時停用噴他脒。
咳嗽和喉嚨痛	若症狀令您非常不舒服，使用潤喉片或止咳藥水。
口有苦味或金屬味	完成噴他脒治療後立即沖洗口腔。若在治療期間出現這情況，可以停吸藥物，然後喝水。