


SULFAMÉTHOXAZOLE/TRIMÉTHOPRIME SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIM

- Aussi connu sous le nom Septra^{MD}, Sulfatrim^{MD}, Bactrim^{MD}, cotrimoxazole
- Ce médicament est disponible sous forme de comprimé oral et d'un liquide spécial si nécessaire.
- Ce médicament n'est pas couvert par BC Transplant et peut être acheté à la pharmacie de votre choix.

À quoi ressemble le médicament?

What does the medication look like?

Il existe plusieurs marques pour ce médicament et il se peut que la vôtre ne soit pas exactement représentée ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre pharmacien spécialisé en transplantation.



À quoi sert ce médicament?

What is this medication for?

Il s'agit d'une combinaison d'antibiotiques utilisés pour prévenir ou traiter un type d'infection pulmonaire appelée PPC ou PPJ qui est causée par un champignon. Ce type d'infection est plus fréquent chez les patients dont le système immunitaire est affaibli (par exemple après une transplantation d'organe).

Comment faut-il prendre ce médicament?

How should I take this medication?

	<p>Prenez ce médicament une fois par jour (par exemple 9 h)</p>	<p>Heure(s) de prise du médicament : _____</p>
	<p>Prenez ce médicament trois fois par semaine</p>	<p>Heure(s) et jour(s) de prise du médicament : _____</p>

- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Il peut être pris à tout moment de la journée et peut être pris en même temps que vos autres médicaments. Il est préférable de le prendre à la même heure chaque jour, afin de garder une quantité constante (niveau de drogue) dans votre corps.
- Prenez avec un grand verre d'eau avec ce médicament. Cela aide à prévenir la formation de calculs rénaux.

Alerte : Ce médicament appartient à la classe des sulfamides et il est très important d'informer votre médecin si vous êtes allergique aux sulfamides.

Dose oubliée ou dose vomie :

Missed Dose or Vomited Dose:

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à l'heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.

Si vous vomissez dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament remonter, répétez la dose. Sinon, continuez avec votre prochaine dose.

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament?

<i>Effets secondaires</i>	<i>Gestion</i>
<i>Nausée, vomissement ou diarrhée</i>	Prenez des médicaments avec de la nourriture pour minimiser ces effets secondaires. Vérifiez auprès de votre médecin si ces symptômes sont dérangeants ou persistants.
<i>Vertiges</i>	Vérifiez auprès de votre médecin si ceci est dérangeant ou persistant.
<i>Hypersensibilité au soleil</i>	Portez un chapeau, des manches longues et un pantalon ou une jupe longue à l'extérieur les jours ensoleillés. Appliquez une lotion solaire avec un FPS (facteur de protection solaire) d'au moins 30.
<i>Éruption cutanée ou urticaire</i>	Prévenez votre médecin ou votre équipe de transplantation dès que possible