

磺胺甲恶唑/甲氧苄啶 SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIM

- 又名 Septra®、Sulfatrim®、Bactrim®、cotrimoxazole
- 该药物剂型为口服片剂，需要时可特制成药液。
- 该药物不受 BC Transplant 承保，可在您选择的药房购买。

这种药物外观是什么样的？ What does the medication look like?

这种药物有多个品牌，以下所列药物可能看起来与您的不完全相同。若有任何疑问，请咨询移植药剂师。



这种药物的用途是什么？ What is this medication for?

这两种抗生素联用可防止或治疗由一类真菌造成的肺部感染，称为“PCP”或“PJP”。该类型的感染在免疫系统薄弱的患者中更为常见（例如器官移植后）。

我应该如何使用这种药物？ How should I take this medication?

该药物 每天服用一次 （例如每天上午 9 点）	您的服药时间：_____
若您每周 3 次服用该药物	您每周的周几服药和服药时间：

- 该药物可以与食物同服，也可单独服用。
- 可在一天中的任何时间服用该药物，也可以与您的任何其他药物共同服用。最好在每天固定时间服用，以保持药物在您体内数量（药物浓度）的稳定。
- 服药时喝满满一杯水。这有助于避免肾结石的形成。

警告：该药物属于磺胺类药物，若您对磺胺类药物过敏，请务必告知医生。

漏服药物或吐出药物： Missed Dose or Vomited Dose:

若您漏服药物，请在记起后尽快服用，并按照规定时间服用下一剂药物。若距离您服用下一剂药物的时间已过一半，则跳过漏服剂量并继续按平时的时间服用下一剂。不要一次服用双倍剂量或额外剂量。

若您在服用药物后 30 分钟内呕吐，或在呕吐物中发现部分药物，请再次服药。否则，请继续按时服用下一剂药物。

这种药物可能的副作用有哪些？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理
恶心、呕吐、腹泻	将药物与食物同服，可将副作用降至最低。若副作用对您造成困扰或持续存在，请咨询医生。
头晕	若此副作用对您造成困扰或持续存在，请咨询医生。
皮肤变得对阳光敏感	在晴天佩戴帽子、穿着长袖、长裤或裙子。涂抹 SPF（防晒系数）至少为 30 的防晒霜
皮疹或瘙痒	请尽快告知医生或移植团队