

والاسیکلوویر VALACYCLOVIR

- ◀ همچنین با نام تجاری Valtrex® نیز شناخته می‌شود
- ◀ این دارو به صورت قرص خوراکی موجود است.
- ◀ BC Transplant این دارو را تامین نمی‌کند و در داروخانه مورد انتخاب خودتان قابل خریداری است.

ظاهر دارو به چه شکل است؟ What does this medication look like?

مارک‌های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک داروی خود را در قسمت زیر مشاهده نکنید. لطفاً اگر سؤالی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.



موارد مصرف این دارو چیست؟ What is this medication for?

این یک داروی آنتی‌ویروس است. برای کمک به پیشگیری از انواع خاصی از عفونت‌های ویروسی مانند هرپس، آبله‌مرغان، زونا و تاول تبخالی، ممکن است در چند ماه اول پس از عمل پیوند valacyclovir دریافت کنید.

این دارو را باید چگونه مصرف کنم؟ How should I take this medication?

زمان مصرف داروی شما:	این دارو را روزی یکبار مصرف کنید (به عنوان مثال 9 صبح)
زمان مصرف داروی شما:	این دارو را روزی دو بار مصرف کنید (به عنوان مثال 9 صبح و 9 شب)

- این دارو با غذا یا بدون غذا قابل مصرف است.
- می‌توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با سایر داروهایتان قابل مصرف است. دارو را هر روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار (سطح دارو) در بدن شما ثابت بماند.

نوبت فراموش شده یا بالا آورده شده: Missed Dose or Vomited Dose:

اگر یک نوبت دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان مقرر مصرف کنید. اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید. داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.

اگر ظرف 30 دقیقه پس از مصرف دارو استفراغ کردید یا مشاهده کردید که مقداری از دارو بالا آمده است، مصرف دارو را تکرار کنید. در غیر این صورت، فقط از نوبت مقرر دوز بعدی خود ادامه دهید.

برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication?

کنترل	عوارض جانبی
همراه با غذا یا شیر مصرف شود. قابل برطرف شدن است، اما در صورت تداوم علائم به پزشک خود اطلاع دهید.	تهوع، استفراغ، اسهال
قابل برطرف شدن است. ممکن است پزشک شما یک مسکن بدون نسخه پیشنهاد کند.	سررد