


伐昔洛韦 VALACYCLOVIR

- 又名 Valtrex® (维德思)
- 该药物剂型为口服片剂。
- 该药物不受 BC Transplant 资助，可在您选择的药房购买。

这种药物外观是什么样的？ What does the medication look like?

这种药物有多个品牌，以下所列药物可能看起来与您的不完全相同。若有任何疑问，请咨询移植药剂师。



这种药物的用途是什么？ What is this medication for?

这是一种抗病毒药物。您在移植后头几个月内可能需要服用伐昔洛韦，以帮助防止某些类型的病毒感染，例如疱疹、水痘、带状疱疹和唇疱疹。

我应该如何服用这种药物？ How should I take this medication?

该药物 每天服用一次 (例如每天上午 9 点)	您的服药时间： _____
该药物 每天服用两次 (例如每天上午 9 点和晚上 9 点)	您的服药时间： _____

- 该药物可以与食物同服，也可单独服用。
- 可在一天中的任何时间服用该药物，也可以与您的任何其他药物共同服用。在每天固定时间服用药物，以保持药物在您体内数量（药物浓度）的稳定。

漏服药物或吐出药物： Missed Dose or Vomited Dose:

若您**漏服药物**，请在记起后尽快服用，并按照规定时间服用下一剂药物。若距离您服用下一剂药物的时间已过一半，则跳过漏服剂量并继续按平时的时间服用下一剂。不要一次服用双倍剂量或额外剂量。

若您在服用药物后 30 分钟内**呕吐**，或在呕吐物中发现部分药物，请再次服药。否则，请继续按时服用下一剂药物。

这种药物可能的副作用有哪些？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理
恶心、呕吐、腹泻	与食物或牛奶同服。可能会缓解消失，但如果症状持续存在，请告知您的医生。
头痛	可能会缓解消失。您的医生可能会建议使用非处方止痛药。