

## 伐昔洛韋 VALACYCLOVIR

- 又名祛疹易 Valtrex®
- 此藥為口服藥片。
- 此藥不是卑詩省移植協會的資助藥物，病人可以在自己選定的藥房購買。

### 藥物外型是怎樣的？ What does this medication look like?

這種藥物有幾個牌子，您的藥物可能跟下圖的不盡相同。若有任何疑問，請向您的移植藥劑師查詢。



### 此藥用來醫治什麼？ What is this medication for?

這是一種抗病毒藥物。您或須在移植後首數個月服用伐昔洛韋，以助預防某幾種病毒感染，例如疱疹、水痘、帶狀疱疹及唇疱疹。

### 應如何服用此藥？ How should I take this medication?

此藥每天服用一次 (例如早上 9 時)	您的服藥時間： _____
此藥每天服用兩次 (例如早上 9 時和晚上 9 時)	您的服藥時間： _____

- 此藥可以隨餐或空腹服用。
- 可以在一天中任何時間服用，也可以跟您的其他任何藥物同時服用。每天都在相同的時間服藥，令體內保持穩定的藥量水平。

### 漏服藥物或嘔吐藥物： Missed Dose or Vomited Dose:

若漏服了一劑藥物，在記起後即盡快補服，然後按照下次的原定服藥時間服藥。若離下次服藥時間已過了一半時間，則不用補服，只需繼續按原定時間服藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若在服藥後 30 分鐘內嘔吐，或在嘔吐物中看見藥物，便須再次服藥，否則只需繼續等至下次服藥時間才服下一劑。

## 此藥可能有什麼副作用？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
噁心、嘔吐、肚瀉	以食物或牛奶送服。或會自行減退，若持續不退，須通知醫生。
頭痛	或會自行減退。您的醫生或會建議您服用非處方止痛藥。