

والگانسیکلوویر VALGANCICLOVIR

- ◀ همچنین با نام تجاری Valcyte®، Apo-valganciclovir®، Auro-valganciclovir نیز شناخته می‌شود.
- ◀ این دارو به صورت قرص یا مایع خوراکی موجود است.

ظاهر دارو به چه شکل است؟ What does the medication look like?

مارک‌های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک داروی خود را در قسمت زیر مشاهده نکنید. لطفاً اگر سؤالی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.



موارد مصرف این دارو چیست؟ What is this medication for?

این دارو یک داروی آنتی‌ویروس است. در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند (به عنوان مثال پس از عمل پیوند عضو)، معمولاً برای پیشگیری یا درمان عفونت ویروسی به نام CMV (Cytomegalovirus) استفاده می‌شود.

این دارو را باید چگونه مصرف کنم؟

این دارو را روزی یکبار مصرف کنید (به عنوان مثال 9 صبح)	زمان مصرف داروی شما: _____
این دارو را روزی دو بار مصرف کنید (به عنوان مثال 9 صبح و 9 شب)	زمان مصرف داروی شما: _____

- این دارو باید همراه با غذا مصرف شود تا جذب بهتری داشته باشد.
- می‌توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با سایر داروهایتان قابل مصرف است. دارو را هر روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار (سطح دارو) در بدن شما ثابت بماند.

دوز فراموش شده یا دوز بالا آورده شده: Missed Dose or Vomited Dose:

اگر یک نوبت دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان مقرر مصرف کنید. اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید. داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.

اگر ظرف 30 دقیقه پس از مصرف دارو استفراغ کردید یا مشاهده کردید که مقداری از دارو بالا آمده است، مصرف دارو را تکرار کنید. در غیر این صورت، صرفاً از نوبت مقرر دوز بعدی خود ادامه دهید.

برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication?

کنترل	عوارض جانبی
<p>همراه با غذا مصرف کنید. اگر این حالت تداوم دارد یا آزاردهنده است، با پزشک خود تماس بگیرید.</p>	<p>تهوع، استفراغ، اسهال</p>
<p>آزمایش خون منظم برای بررسی تعداد سلول‌های خونی شما انجام شود. در صورت داشتن هر یک از موارد زیر، با پزشک خود مشورت کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه‌ها یا علائم عفونت مانند تب یا لرز، سرفه، گلودرد، یا درد یا مشکل در دفع ادرار • علائم خونریزی مانند کبودی، مدفوع قیری‌رنگ، استفراغ خون یا وجود خون در ادرار • علائم کاهش گلبول‌های قرمز، مانند ضعف یا خستگی غیرمعمول، غش کردن، یا سبکی سر. 	<p>Valganciclovir تعداد گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز و پلاکت‌های شما را کاهش دهد.</p> <p>ممکن است شما در معرض خطر عفونت و خونریزی باشید.</p>