

VALGANCICLOVIR

- Aussi connu sous le nom de Valcyte^{MD}, Apo-valganciclovir^{MD}, Auro-valganciclovir
- Ce médicament est disponible sous forme de comprimé oral et de liquide.

À quoi ressemble le médicament?

What does the medication look like?

Il existe plusieurs marques pour ce médicament et il se peut que la vôtre ne soit pas exactement représentée ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre pharmacien spécialisé en transplantation.



À quoi sert ce médicament?

What is this medication for?

C'est un médicament antiviral. Chez les patients dont le système immunitaire est affaibli (par exemple après une transplantation d'organe), il est le plus souvent utilisé pour prévenir ou traiter une infection virale appelée CMV (infection à cytomégalovirus).

Comment faut-il prendre ce médicament?

How should I take this medication?

Prenez ce médicament une fois par jour (par exemple 9 h)	Heure(s) de prise du médicament : _____
Prenez ce médicament deux fois par jour (par exemple 9 h 00 et 21 h)	Heure(s) de prise du médicament : _____

- Ce médicament doit être pris avec des aliments pour améliorer l'absorption.
- Il peut être pris à tout moment de la journée et peut être pris en même temps que vos autres médicaments. Prenez-le tous les jours à la même heure de la journée afin de maintenir une quantité constante (niveau de médicament) dans votre corps.

Dose oubliée ou dose vomie :

Missed Dose or Vomited Dose:

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à l'heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.

Si vous vomissez dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament remonter, répétez la dose. Sinon, continuez avec votre prochaine dose.

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament?

What are some possible side effects of this medication?

Effets secondaires	Gestion
<i>Nausée, vomissement ou diarrhée</i>	Prenez ce médicament avec de la nourriture. Contactez votre médecin si ces symptômes sont dérangeants ou persistants.
<i>Le valganciclovir peut réduire le nombre de vos globules blancs, globules rouges et plaquettes.</i> <i>Vous pourriez présenter un risque accru d'infection et de saignement.</i>	Des analyses sanguines régulières seront effectuées pour vérifier vos numérations sanguines. Appelez votre médecin si vous ressentez un des symptômes suivants : <ul style="list-style-type: none"> • des signes et symptômes d'infection tels que fièvre ou frissons, toux, mal de gorge, douleur ou difficulté à uriner; • des signes de saignement tels que des ecchymoses, des selles noires et goudroneuses, des vomissements de sang ou du sang dans les urines; • des signes de diminution des globules rouges, comme une faiblesse ou une fatigue inhabituelle, des évanouissements ou des étourdissements.