

वैल्गनसायक्लोविर (VALGANCICLOVIR)

- इसे वैल्साइट®, एपो-वैन्गनसायक्लोविर®, औरो-वैल्गनसायक्लोविर के नाम से भी जाना जाता है
- यह दवा खाने वाली गोली या पीने वाली दवा के रूप में उपलब्ध है।

यह दवा कैसी दिखती है? (What does the medication look like?)

इस दवा के लिए कई ब्रांड हैं और हो सकता है कि आपको नीचे दिखाए गए ब्रांड जैसा अपना ब्रांड न मिले। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने ट्रांसप्लांट फार्मासिस्ट से संपर्क करें।



यह दवा किस बीमारी के लिए है? (What is this medication for?)

यह एक एंटीवायरल दवा है। अधिकतर इसका उपयोग आमतौर पर कमजोर प्रतिरक्षा-प्रणाली वाले रोगियों (उदाहरण के लिए अंग ट्रांसप्लांट के बाद) में CMV (साइटोमैगालोवायरस) नामक वायरल संक्रमण को रोकने या उसका इलाज करने के लिए किया जाता है।

मुझे यह दवा कैसे लेनी चाहिए? (How should I take this medication?)

यह दवा दिन में एक बार लें (उदाहरण के लिए सुबह 9 बजे)	आपकी दवा का समय: _____
यह दवा दिन में दो बार लें (उदाहरण के लिए सुबह 9 बजे और रात 9 बजे)	आपकी दवा का समय: _____

- शरीर में अच्छी तरह जड़ब करने के लिए यह दवा भोजन के साथ ली जानी चाहिए।
- यह दवा दिन में किसी भी समय ली जा सकती है और अपनी किसी भी अन्य दवा के तौर पर उसी समय ली जा सकती है। अपने शरीर में स्थिर मात्रा (दवा का स्तर) बनाए रखने के लिए इसे रोज़ाना एक ही समय पर लें।

छूटी हुई खुराक या उल्टी द्वारा निकली खुराक (Missed Dose or Vomited Dose):

यदि आपसे खुराक छूट गई है, जैसे ही आपको याद आए, अपनी दवा लें और फिर अपनी अगली खुराक नियमित तौर पर निर्धारित समय पर लें। यदि आपकी अगली खुराक लेने में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो अपनी छूटी हुई खुराक न लें और अपने नियमित समय पर खुराक लेना जारी रखें। दोगुनी या अतिरिक्त खुराक न लें।

यदि खुराक लेने के 30 मिनट के भीतर आपको उल्टी हो जाती है या यदि आप देखते हैं कि कोई दवा बाहर निकली है, तो खुराक दोबारा लें। नहीं तो, बस अपने अगले निर्धारित समय पर खुराक लेते रहें।

इस दवा के कुछ संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं? (What are some possible side effects of this medication?)

दुष्प्रभाव	प्रबंधन
मतली, उल्टी, दस्त	भोजन के साथ लें। यदि यह बने रहते हैं या बहुत परेशान करने वाले हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं।
<p>वैल्गनसायक्लोविर आपके खून की सफेद कोशिकाओं, लाल रंग की कोशिकाओं और प्लेटलेट्स की संख्या कम कर सकती है।</p> <p>आप संक्रमण और खून निकलने के बढ़े हुए जोखिम पर हो सकते हैं</p>	<p>आपके खून की कोशिकाओं की संख्या की जांच करने के लिए खून का आम नियमित टेस्ट किया जाएगा। यदि आपको इन में से कोई है, तो अपने डॉक्टर से पता लगाएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> संक्रमण के संकेत और लक्षण, जैसे बुखार या कंपकंपी, खांसी, गले में खराश या दर्द या पेशाब करने में कठिनाई खून निकलने के संकेत, चोट लगना, जैसे काली, गहरे रंग की मल, खून की उल्टी या पेशाब में खून खून की लाल कोशिकाएं घटने के संकेत, जैसे कमजोरी या थकान, थोड़े समय के लिए अचेत होना, चक्कर आना खून की लाल कोशिकाएं घटने के संकेत, जैसे कमजोरी या थकान, थोड़े समय के लिए अचेत होना, चक्कर आना