

缬更昔洛韦 VALGANCICLOVIR

- 又名 Valcyte®（万赛维）、Apo-valganciclovir®、Auro-valganciclovir
- 该药物剂型为口服片剂或口服液。

这种药物外观是什么样的？ What does the medication look like?

这种药物有多个品牌，以下所列药物可能看起来与您的不完全相同。若有任何疑问，请咨询移植药剂师。

缬更昔洛韦 450 mg，片剂



这种药物的用途是什么？ What is this medication for?

这是一种抗病毒药物。对于免疫系统被削弱的患者（例如器官移植后患者），这种药物最常被用来防止或治疗称为 CMV（巨细胞病毒）的病毒感染。

我应该如何使用这种药物？ How should I take this medication?

该药物 每天服用一次 (例如每天上午 9 点)	您的服药时间： _____
该药物 每天服用两次 (例如每天上午 9 点和晚上 9 点)	您的服药时间： _____

- 这种药物应与食物同服，以增进吸收。
- 可在一天中的任何时间服用该药物，也可以与您的其他药物共同服用。在每天固定时间服用药物，以保持药物在您体内数量（药物浓度）的稳定。

漏服药物或吐出药物： Missed Dose or Vomited Dose:

若您**漏服药物**，请在记起后尽快服用，并按照规定时间服用下一剂药物。若距离您服用下一剂药物的时间已过一半，则跳过漏服剂量并继续按平时的时间服用下一剂。不要一次服用双倍剂量或额外剂量。

若您在服用药物后 **30 分钟内呕吐**，或在呕吐物中发现部分药物，请再次服药。否则，请继续按时服用下一剂药物。

这种药物可能的副作用有哪些？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理
恶心、呕吐、腹泻	与食物同服。若副作用持续或对您造成困扰，请联系医生。
<p>缬更昔洛韦可降低白细胞、红细胞和血小板数量。</p> <p>您受到感染和出血的风险将上升。</p>	<p>您将接受常规血液检查以了解您的血细胞数量。若您出现以下任何情况，请咨询医生：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 感染的征象和症状，例如发热或寒颤、咳嗽、喉咙疼痛、排尿疼痛或困难 • 出血征象，例如淤青、发黑、柏油样便、呕血或血尿 • 红细胞减少征象，例如异常疲乏倦怠、昏厥、头晕。