


## فيلجراستيم FILGRASTIM

- ◀ يعرف كذلك باسم العامل المحفز لتكاثر الخلايا المحببة (G-CSF)، نيوبوجن®، جراستوفيل®
- ◀ يتوفر في صورة محاقن معبأة مسبقًا بأحجام ٣٠٠ مكغ أو ٤٨٠ مكغ وجهازة للحقن

كيف يبدو شكل الدواء؟

What does the medication look like?



لماذا يستخدم هذا الدواء؟

What is this medication for?

- قد تؤدي الأدوية المضادة لرفض الزرع أو المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية أو أي مجموعة من تلك الأدوية إلى انخفاض خلايا الدم البيضاء في دمك. مما يتسبب في خفض قدرة جسمك على مكافحة الأمراض. فيلجراستيم يخبر نخاع العظمي بضرورة إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء ويقلل من خطر تعرضك للأمراض.

كيف يجب أن أتناول هذا الدواء؟

How should I take this medication?

- إن عدد خلايا الدم البيضاء في جسمك هي التي تحدد الكمية التي تحتاجها من فيلجراستيم. وعادة ما تحصل على حقنة يوميًا لمدة ٣ أيام ويتم تكرار فحص عدد خلايا الدم البيضاء بعد ذلك لضمان أنك حصلت على الكمية المناسبة من الدواء.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| يتم إعطاء هذا الدواء عادة يوميًا لمدة ٣ أيام | وقت وأيام الدواء: _____ |
|--|-------------------------|

- يمكن إعطاء فيلجراستيم بالحقن تحت الجلد. ويمكن للمريض في العيادة أن يوضح لك كيفية إعطاء حقنة الدواء تحت الجلد في المنزل.

تفويت جرعة أو تقيؤ جرعة:

Missed Dose or Vomited Dose:

- إذا فاتك الحصول على أي جرعة، فخذ دواءك فور التذكير، ومن ثم خذ الجرعة التالية في موعدها المعتاد. لا تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافية.
- إذا كنت ستتوجه إلى العيادة للحصول على الحقن، من المهم أن تنتظم في الحضور في المواعيد المحددة وعدم تفويت الأيام. لن يعمل الدواء بشكل صحيح إذا فوت الحقن ولا يمكن "التعويض" عن الجرعات الفائتة عن طريق الحصول على جرعات إضافية.

ما هي بعض الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء؟

What are some possible side effects of this medication?

| الآثار الجانبية                   | السيطرة عليه   |
|-----------------------------------|--|
| تهيج في موضع الحقن                | قد تتوقف الأعراض؛ قد يقترح طبيبك استخدام مسكن للألم دون وصفة طبية أو كمادات باردة.                                     |
| آلم في العظم أو المفصل أو العضلات | سيتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خلايا دمك البيضاء. حيث قد تتعرض للمزيد من الآثار الجانبية إذا تناولت كمية زائدة. |
| صداع، أعراض تشبه الإنفلونزا       | قد تتوقف الأعراض؛ قد يقترح طبيبك استخدام مسكن للألم دون وصفة طبية.   |