

非格司亭 FILGRASTIM

- 又名 G-CSF（欣粒生）、Neupogen®（优保津）、Grastofil®
- 剂型为 300mcg 或 480mcg 的预填充注射器

这种药物外观是什么样的？ What does the medication look like?



这种药物的用途是什么？ What is this medication for?

- 抗排斥药、抗病毒药、抗生素或这些药物的联合使用可能会降低您的白细胞。这会降低您身体抵御感染的能力。非格司亭会让您的骨髓制造更多的白细胞并降低感染的风险。

我应该如何使用这种药物？ How should I take this medication?

您的白细胞计数决定了您需要的非格司亭用量。通常，您将进行 3 天的注射，每日一次，之后会重复检测白细胞计数，确保您注射的剂量恰到好处。

该药物通常使用 3 天，每天一次。	您的用药日期和时间： _____
-------------------	------------------

- 非格司亭可以经皮下给药（皮下注射）。您的诊所护士可以向您展示如何在家中如何进行皮下给药。

漏用药物或吐出药物： Missed Dose or Vomited Dose:

若您漏用药物，请在记起后尽快注射，并按照规定时间注射下一剂药物。不要一次使用双倍剂量或额外剂量。

如果您需前往诊所接受注射，请按时前往，切勿错漏数天，这一点至关重要。如果您漏了注射，该药物将无法正常工作，并且漏用剂量将不会通过给予额外剂量而得到“弥补”。

这种药物可能的副作用有哪些？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理
注射部位刺激	可能会缓解消失；您的医生可能会建议使用非处方止痛药或进行冷敷。
骨、关节或肌肉疼痛	您将接受常规血液检查以了解您的白细胞数量。因为如果过度用药，将会出现更多副作用。
头痛，流感样症状	可能会缓解消失；您的医生可能会建议使用非处方止痛药。