

惠爾血添 FILGRASTIM

- 又名 G-CSF、Neupogen®、Grastofil®
- 為預先注入針筒提供 300 微克或 480 微克的注射劑

藥物外型是怎樣的？What does the medication look like?



此藥用來醫治什麼？What is this medication for?

- 使用抗排斥藥、抗病毒藥、抗生素或混合使用這些藥物，都可能降低您的白血球，削弱身體抵抗感染的能力。惠爾血添通知骨髓製造更多白血球，以減低感染風險。

應如何服用此藥？How should I take this medication?

您的白血球指數將決定您需要多少惠爾血添。在一般情況下，您是連續 3 天每天注射一劑，然後再測試白血球指數，以確定所接受的劑量是剛好的份量。

此藥物一般是連續 3 天每天注射一劑

您的注射日期和時間： _____

- 惠爾血添也可透過皮下注射。您的診所護士可以為您示範如何在家中皮下注射此藥。

漏服藥物或嘔吐藥物：Missed Dose or Vomited Dose:

若遲了注射藥物，在記起後即盡快補回，然後按照下次的原定注射時間用藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若是前來診所注射藥物，您必須準時在指定日子注射，不能延遲注射日子。若遲了注射，藥物將不能發揮其預期作用，錯過了的劑量也不能靠注射額外劑量得到「補償」。

此藥可能有什麼副作用？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
落針處不適	可能自行減退；您的醫生可能建議您服用非處方止痛藥或使用冷敷。
骨、關節或肌肉疼痛	定期驗血檢查白血球指數，因為用藥過量將引起更多副作用。
頭痛、與流感相似的症狀	可能自行減退；您的醫生可能建議您服用非處方止痛藥。