



大麻：Marijuana:

須知事項

核准使用大麻：Approved Marijuana Use:

加拿大衛生部目前已核准在以下情況使用大麻：

- 因癌症治療導致噁心和嘔吐
- 用來舒緩多發性硬化症(MS)的神經痛 / 疼痛及肌肉抽搐
- 晚期癌症的嚴重痛楚

在其他情況下使用則屬於藥品仿單標示外使用(off-label)，沒有證據支持其有效性。

可買商業藥品：Available Commercial Drug Products:

- 大麻隆 Nabilone (Cesamet®) - 口服膠囊
- Tetranabinex/ nabidiolex (Sativex®) - 口腔噴劑 (噴入口腔內面頰處)

未領牌照的產品欠缺品質管制，受殺蟲劑或細菌 / 真菌污染的風險可能較大。

藥物的相互作用：Drug Interaction:

大麻可以跟您的抗排斥藥、他克莫司或環孢素產生相互作用，病人因此或須更頻密地驗血，以確保藥物水平 (體內的藥量) 維持在理想範圍內。藥量太高可能會導致更多副作用，藥量太低則增加排斥機會。

吸食 / 深吸大麻的風險：Risk of Smoking/ Inhalation Marijuana:

吸食大麻的移植受贈者可能會受到麴菌屬感染。這是一種由真菌引致的嚴重肺部感染，可損害人體健康及致命。深吸大麻油可引致脂質性肺炎 (一種可以致命的嚴重肺部感染)。我們不建議移植病人吸食或深吸大麻。

若對此資料頁的內容有任何疑問，請向您的藥劑師查詢。

可食用大麻 (例如曲奇餅) 的風險 : Risk of Edible Marijuana (e.g. cookies):

每件產品所含的 THC / 大麻酚 (大麻的活躍成份) 份量各異，病人必須定期驗血，以確保藥物水平維持在理想範圍內。一般來說，相比於吸食大麻，可食用大麻被視為傷害性較低，因為它導致麴菌屬肺部感染的機會較低。

副作用 : Side Effects:

- 短期副作用：噁心、思緒混亂、頭暈、暈眩 (感到天旋地轉)
- 可能的長期副作用：焦慮、抑鬱、記性、思考和推理能力變差

若對此資料頁的內容有任何疑問，請向您的藥劑師查詢。