

為何接種疫苗？

疫苗可以拯救生命，保護人體免受危險和致命感染。您和其他器官移植受贈者一樣，由於正在服用抗排斥藥，令免疫系統變弱，因此受感染的風險更高。

最理想的情況是，您應該在接受移植**之前**便接種了所有必要疫苗，但假若您在移植前沒有足夠時間接受全部建議疫苗，也可以在完成移植手術的 3 至 6 個月後接種。

不活化疫苗是安全的，但**活體疫苗在移植後便不安全了。請向您的移植團隊查詢。**

您的移植團隊建議接種以下疫苗：

- 流感嗜血桿菌疫苗(Hib)
- 乙型肝炎疫苗
- 人類乳頭狀瘤病毒疫苗(HPV) (Gardasil®)
- 滅活小兒麻痺疫苗 (IPV)
- 流行性感感冒(流感)疫苗
- 腦膜炎雙球菌疫苗 (四價)
- 肺炎鏈球菌疫苗 (Pneumovax-23®)
- 肺炎鏈球菌疫苗(Pneumovax-23®)
- 帶狀疱疹疫苗 (Shingrix®)
- 破傷風、白喉 (Td) 或破傷風、白喉、百日咳 (Tdap) 疫苗

帶狀疱疹疫苗 (Shingrix®)

這疫苗保護您避免患上帶狀疱疹 (俗稱生蛇)，此病是因一種名為水痘帶狀疱疹的病毒所致，導致皮膚出現痛楚的紅疹和水疱，症狀可持續 2 至 4 星期。

每 3 人中有一人將在其一生中患上帶狀疱疹，患者多見於 50 歲或以上或免疫力減弱的人士。50 歲或以上的器官移植受贈者應該接種Shingrix® 疫苗。

您將需要接種兩劑疫苗，中間相隔 2 至 6 個月。

費用：此疫苗是需要付費的。

乙型肝炎疫苗

這疫苗可保護您避免患上乙型肝炎和其併發症（例如永久肝臟損壞）。乙型肝炎是透過血液或體液傳播的。

疫苗須在 3 個月內分 3 劑接種。接種完最後一劑後的 1 至 2 個月內驗血，以檢查身體對疫苗的反應。

費用：此疫苗是免費的。

人類乳頭狀瘤病毒(HPV9)疫苗 (Gardasil®)

這疫苗可保護您避免患上HPV病毒所致的子宮頸癌、肛門癌及生殖器疣。HPV是最常見經由性接觸傳染的感染。

疫苗須在 3 個月內分 3 劑接種。建議有風險的人士接種這疫苗。請向您的團隊查詢您是否應該接種這疫苗。

費用：此疫苗是需要付費的。

流感疫苗

流感（流行性感感冒感染）可引致嚴重及危害生命的疾病，並增加其他感染風險，尤其是長者和免疫力減弱的人士。

它是經由咳嗽、打噴嚏或面對面接觸作人傳人的傳染。每年都應該接種流感疫苗，保護自己避免感染季節性流感。

費用：不活化流行性感感冒疫苗是免費的。

肺炎鏈球菌疫苗 (Pneumovax-23® 及 Pprevnar 13®)

這疫苗可保護您免受多種肺炎鏈球菌感染，這些細菌可引致嚴重及致命的疾病，包括：

- **腦膜炎**：包裹大腦的薄膜感染
- **肺炎**：肺部感染
- **敗血症**：血液感染

肺炎鏈球菌感染是經由咳嗽、打噴嚏、近距離面對面的接觸或唾液／吐口水傳播。

您的移植團隊建議您考慮接種 Pneumovax-23® 疫苗和 Pprevnar 13® 疫苗。

費用：Pneumovax-23® 疫苗是免費的，但 Pprevnar 13® 疫苗則需要付費。

到哪裡接種疫苗？

- 公共衛生部門
- 家庭醫生診所
- 區內藥房

腦膜炎雙球菌疫苗 (四價)

這疫苗可保護您免受四種最常見的腦膜炎雙球菌感染 – A、C、Y 及 W。

腦膜炎感染是經由咳嗽、打噴嚏或面對面的接觸作人傳人的傳播，亦可以經由唾液傳播。

即使情況罕見，但此細菌可以引致嚴重及致命的感染，包括血液和腦部感染。感染併發症可以是很嚴重的，可包括腦部永久損壞、失聰及失去四肢。

費用：此疫苗是免費的。每5年接種一次加強劑。


避免接種活體疫苗

若家中成員接種活體疫苗，請向您的移植團隊查詢。

- 肺結核 BCG 疫苗 (Oncotice®)
- 鼻內流行性感感冒疫苗 (FluMist®)
- 麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR, Priorix®)
- 口服甲狀腺疫苗 (Vivotif®)
- 水痘帶狀疱疹疫苗 (Varivax®, Zostavax®)
- 黃熱病疫苗 (YF-VAX®)

固體器官移植受贈者 接種疫苗

您是否如期接種了各種疫苗？



Vancouver
Coastal Health



island health



northern health
the northern way of caring



fraser health



Interior Health



Provincial Health
Services Authority
Province-wide solutions.
Better health.