


## ਅਗਾਂਥੀਓਪ੍ਰੀਨ AZATHIOPRINE [AZ-A-THIGH-O-PREEN]

- ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੂਰਾਨ, ਟੇਵਾ-ਏਜ਼ੀਥੋਪ੍ਰੀਨ, ਐਥੋਥੀਓਪ੍ਰੀਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਘੋਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

### ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? What does the medication look like?

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਚਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।



### ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? What is this medication for?

ਐਜ਼ੀਥੀਓਪ੍ਰੀਨ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।

### ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? How should I take this medication?

ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਐਜ਼ੀਥੀਓਪ੍ਰੀਨ ਲਈ: ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵੋ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ:
--	----------------------

- ਐਜ਼ੀਥੀਓਪ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਵੋ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜ ਬੜ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਰਹੇ ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵੋ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਲਵੋ।
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ACE ਇਨਹਿਬਿਟਰਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਬੈਂਜ਼ੋਪਰਿਲ (ਲੋਟੇਨਸਿਨ), ਕੈਪਟੋਪਰਿਲ (ਕੈਪੋਟੈਨ), ਐਨਲਾਪਰਿਲ (ਵੈਸੋਟੈਕ), ਫੋਪਸੀਨੋਪਰਿਲ (ਮੋਨੋਪਰਿਲ), ਲਿਸਿਨੋਪਰਿਲ (ਜ਼ੈਸਟਾਰਿਲ, ਪਰਿਨੀਵਿਲ), ਕ੍ਰੋਇਨਾਪਰਿਲ (ਅਕਿਊਪਰਿਲ), ਰਮੀਪਰਿਲ (ਅਲਟੈਕ), ਟ੍ਰਾਂਡੋਲਾਪਰਿਲ (ਮਵਿਕ), ਪੇਰਿੰਦੋਪਰਿਲ (ਕੇਵਰਸਲੀ) ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ੀਥੀਓਪ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ।
- ਜਦੋਂ ਐਜ਼ੀਥੀਓਪ੍ਰੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਗਠੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਪੁਰੀਨੋਲ (ਜ਼ਾਈਲੋਪਰਿਮ) ਅਤੇ ਫੀਬਕਸੋਸਟੈਟ (ਉਲੋਰਿਕ) ਨਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

**ਯਾਦ ਰੱਖੋ:** ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰੋ।

## ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: Missed Dose or Vomited Dose:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੋ।

## ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? What are some possible side effects of this medication?

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Side Effect	ਇਲਾਜ Management
ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਲਨ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ	ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ਾਥੀਓਪ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਐਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਐਜ਼ਾਥੀਓਪ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਸੈੱਲਾਂ, ਲਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ	ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ:  <ul style="list-style-type: none"> <li>ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣ (ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ, ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਦਰਦ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ)</li> <li>ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਰਗੜਾਂ, ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ, ਉਲਟੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ)</li> <li>ਖੂਨ ਵਿਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ)</li> </ul> ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਠੰਢ/ਫਲੂ) ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ	ਇਹ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਾਲ ਝੜਣੇ	ਇਹ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ	ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਕ” ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।