

硫唑嘌呤 (AZATHIOPRINE) [AZ-A-THIGH-O-PREEN]

- 又名 Imuran、Teva-Azathioprine。Apo-azathioprine
- 剂型为口服片剂或由药房特制的混悬剂

这种药物外观是什么样的？ What does the medication look like?

这种药物由多个品牌，以下所列药物可能看起来与您的不完全相同。若有任何疑问，请咨询移植药剂师。



这种药物的用途是什么？ What is this medication for?

硫唑嘌呤是一种用来削弱您身体免疫系统的药物，以防您的移植器官受到排斥。它会弱化您的白细胞，使其无法损伤新器官。

我应该如何服用这种药物？ How should I take this medication?

您必须在每天固定时间服用药物，以保持药物在您体内数量（药物浓度）的稳定。

硫唑嘌呤：该药物每天服用一次 （例如每天上午 9 点）	您的服药时间： _____
--------------------------------	---------------

- 硫唑嘌呤可以与食物同服，也可单独服用。与食物同服可减少胃部不适，但若您愿意，也可空腹服用。保持一致，若您选择与食物同服，请一直保持该做法；若您选择空腹服用，也请保持该做法。
- 称为血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂的血压控制药物，例如：贝那普利 (Lotensin®)、卡托普利 (Capoten®)、依那普利 (Vasotec®)、福辛普利 (Monopril®)、赖诺普利 (Zestril, Prinivil®)、喹那普利 (Accupril®)、雷米普利 (Altace®)、群多普利 (Mavik®)、培哚普利 (Coversyl®) 与硫唑嘌呤一同服用，可削弱您的白细胞和红细胞。
 若您开始服用任何此类药物，请通知移植团队，因为您可能需要额外的血液监测。
- 若您需要在未进食（空腹）状态下接受医疗程序或手术，您仍必须在正常服药时间用一小口水服用移植药物。
- 服用硫唑嘌呤期间，请不要服用痛风治疗药物别嘌醇 (Zyloprim®) 和非布司他 (Uloric®)，因为这可能导致非常严重的副作用！请联系移植药剂师。

请牢记：若您计划怀孕或已经怀孕，您必须尽快咨询医生或移植团队。

漏服药物或吐出药物：Missed Dose or Vomited Dose:

若您漏服药物，请在记起后尽快服用，并按照规定时间服用下一剂药物。若距离您服用下一剂药物的时间已过一半，则跳过漏服剂量并继续按平时的时间服用下一剂。不要一次服用双倍剂量或额外剂量。

若您漏服 1 天以上的抗排斥药物，请立即联系移植团队以获得进一步指导。

若您在服用药物后 30 分钟内呕吐，或在呕吐物中发现部分药物，请再次服药。否则，请继续按时服用下一剂药物。

这种药物可能的副作用有哪些？ What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理
胃灼热、恶心、呕吐和腹泻	若服用硫唑嘌呤让您感到胃部不适，请与食物同服。继续服用药物通常可缓解不适。若副作用对您造成困扰，请告知医生或移植团队。
硫唑嘌呤可降低白细胞、红细胞和血小板数量。 您受到感染和出血的风险将上升	您将接受常规血液检查以了解您的血细胞数量。 若您出现以下任何情况，请咨询医生： <ul style="list-style-type: none"> • 感染的征象或症状（发热或寒颤、咳嗽、喉咙疼痛或排尿困难） • 出血征象（淤青、柏油样便、呕血或血尿） • 红细胞减少征象（疲乏倦怠、昏厥、头晕） 避免与有活动性感染（如感冒/流感）的人近距离接触。勤洗手。
肝脏损伤	此副作用 <u>不常见</u> 。 若您的皮肤、眼睛出现黄疸，或出现胃痛、腹痛，请告知医生。您将接受常规血液检查以监测您的肝功能。
头发稀疏或脱发	此副作用不常见。若此现象对您造成困扰或持续存在，请咨询医生。
癌症	服用这种药物可能提高您罹患皮肤癌或其它癌症的风险。若您被诊断为罹患癌症，请告知移植团队。如需更多信息，请查阅“癌症风险 (Cancer Risk)”一节。