



SIROLIMUS [SI-RO-LI-IMUS]

SIROLIMUS [SI-ROL-IMUS]

- Aussi connu sous le nom de Rapamune^{MD}
- Ce médicament est disponible sous forme de comprimé ou de solution orale.

À quoi ressemble le médicament?

What does the medication look like?

<p>Sirolimus 1 mg Comprimé blanc</p> 	<p>Sirolimus 1 mg/ml solution orale</p> 
---	--

À quoi sert ce médicament?

What is this medication for?

Le sirolimus est un médicament utilisé pour abaisser le système immunitaire de votre corps afin d'empêcher votre organe transplanté d'être rejeté. Il rend vos globules blancs plus faibles afin qu'ils ne puissent pas endommager le nouvel organe.

Comment faut-il prendre ce médicament?

How should I take this medication?

Il est important de prendre vos médicaments à la même heure chaque jour afin de garder une quantité constante (niveau de médicament) dans votre corps.

Prenez ce médicament UNE FOIS par jour (par exemple 9 h)	Heure(s) de prise du médicament : _____
--	--

- Le sirolimus peut être pris avec ou sans nourriture. Le prendre avec de la nourriture peut aider à diminuer les maux d'estomac. Soyez cohérent, si vous le prenez avec de la nourriture, prenez-le toujours avec de la nourriture; si vous le prenez à jeun, prenez-le toujours à jeun.
- Évitez le pamplemousse, le jus de pamplemousse, le pomelo ou l'orange de Séville ou son jus pendant le traitement par ce médicament en raison d'une interaction grave.
- Si vous devez subir une intervention ou une opération qui vous oblige à ne rien manger avant (jeûne), vous **devez** prendre quand même vos médicaments pour la transplantation avec une gorgée d'eau à l'heure habituelle.

Rappelez-vous : si on vous demande de faire un dosage de sirolimus, ne prenez PAS votre dose du matin avant votre prise de sang. Essayez de programmer vos analyses de sang à l'heure à laquelle vous devez prendre votre médicament. Apportez votre dose à la clinique ou au laboratoire pour pouvoir la prendre après l'analyse de sang.

Dose oubliée ou dose vomie :

Missed Dose or Vomited Dose:

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à l'heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.

Si vous avez **manqué plus d'un jour** de médicaments antirejet, contactez immédiatement votre équipe de transplantation pour obtenir des instructions supplémentaires.

Si vous vomissez dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament remonter, répétez la dose. Sinon, continuez avec votre prochaine dose.

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament?

What are some possible side effects of this medication?

<i>Effets secondaires</i>	<i>Gestion</i>
Taux de cholestérol élevé	Mangez des repas sains et équilibrés. Consommez des aliments moins riches en graisses et en sucre.
Hypertension artérielle	Vérifiez votre tension artérielle régulièrement. Vous pourriez avoir besoin de médicaments pour la tension artérielle.
Le sirolimus peut réduire le nombre de vos globules blancs, globules rouges et plaquettes. Vous pourriez présenter un risque accru d'infection et de saignement.	Des analyses sanguines régulières seront effectuées pour vérifier vos numérations sanguines. Signalez à votre médecin ou à votre équipe de transplantation : <ul style="list-style-type: none"> • Signes d'infection (fièvre, frissons, rythme cardiaque rapide, rhume et grippe) à votre équipe de transplantation. Essayez d'éviter tout contact étroit avec les personnes qui ont des infections actives. Lavez-vous fréquemment les mains. • Signes de saignement (ecchymoses, selles goudronneuses, vomissements de sang ou de sang dans l'urine). • Signes de diminution du nombre de globules rouges (faiblesse ou fatigue, évanouissements, vertiges).
Ulcères buccaux	Pratiquez une bonne hygiène buccale. Rincez-vous soigneusement la bouche après avoir pris le médicament. Contactez votre médecin en cas d'ulcères, car il peut être nécessaire de réduire votre dose de sirolimus. Des rince-bouche ou des pâtes anti-inflammatoires peuvent être prescrits pour résoudre les aphtes et réduire la douleur.
Éruptions cutanées ou acné	Communiquez immédiatement avec votre médecin en cas d'éruption cutanée.
Cicatrisation plus lente	Informez votre médecin transplantateur si cela devient un problème.
Problèmes de poumons	Contactez immédiatement votre médecin si l'un des symptômes suivants survient : essoufflement, douleur thoracique, toux tenace, fièvre non liée à une autre maladie.
Cancer	La prise de ce médicament peut augmenter votre risque de cancer de la peau et d'autres cancers. Veuillez informer votre équipe de transplantation si vous recevez un diagnostic de cancer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Risque de cancer ».