



सिरोलिम्स(SIROLIMUS [SI-ROL-IMUS])

- इसे रैपामुन के नाम से भी जाना जाता है®
- यह दवा खाने वाली गोली या पीने वाली दवा के रूप में उपलब्ध है।

दवा कैसी दिखती है?(What does the medication look like?)

<p>सिरोलिम्स 1 मिग्रा सफेद गोली</p> 	<p>सिरोलिम्स 1 मिग्रा/mL पीने वाली दवा</p> 
---	--

यह दवा किस लिए है? (What is this medication for?)

आपके ट्रांसप्लांट किए गए अंग को अस्वीकृत होने से रोकने हेतु सिरोलिम्स आपके शरीर की प्रतिरक्षा-प्रणाली को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। यह आपके खून की सफेद कोशिकाओं को कमजोर करती है, जिस कारण वे नए अंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।

मुझे यह दवा कैसे लेनी चाहिए? (How should I take this medication?)

अपने शरीर में स्थिर मात्रा (दवा का स्तर) बनाए रखने के लिए अपनी दवाएं रोज़ाना एक ही समय पर लेना बहुत ज़रूरी है।

<p>यह दवा दिन में एक बार लें (उदाहरण के लिए सुबह 9 बजे)</p>	<p>आपकी दवा का समय: _____</p>
---	-------------------------------

- सिरोलिम्स भोजन के साथ या बिना भोजन ली जा सकती है। इसे भोजन के साथ लेने से पेट की गड़बड़ी कम करने में मदद मिल सकती है। एक सा नियम अपनाएं, यदि आप इसे भोजन के साथ लेते हैं, तो इसे हमेशा भोजन के साथ लें; यदि आप इसे खाली पेट लेते हैं, तो इसे हमेशा खाली पेट ही लें।
- गंभीर परस्पर प्रभाव पड़ने के कारण, यह दवा लेते समय चकोतरा या चकोतरे का जूस, पोमैलो या सेविल ऑरेंज फल/जूस खाने/पीने से बचें।
- यदि आपको किसी प्रक्रिया या ऑपरेशन के लिए जाने की ज़रूरत है, तो आपको (उपवास) से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए आपको अभी भी अपने नियमित समय पर पानी के साथ अपनी ट्रांसप्लांट की दवाएं **ज़रूर** लेनी चाहिए।

याद रखें: यदि आपको सिरोलिम्स के स्तर की जांच करवाने के लिए कहा जाता है, तो अपने खून का आम टेस्ट करने से पहले अपनी सुबह की खुराक न लें। अपनी दवा लेने के समय के आसपास अपने खून का आम टेस्ट करने का प्लान बनाने की कोशिश करें। क्लिनिक या लैब में अपनी खुराक लाएं, ताकि आपके खून का टेस्ट किए जाने के बाद आप खुराक ले सकें।

छूटी हुई खुराक या उल्टी द्वारा निकली खुराक (Missed Dose or Vomited Dose:)

यदि आपसे खुराक छूट गई है, जैसे ही आपको याद आए, अपनी दवा लें और फिर अपनी अगली खुराक नियमित तौर पर निर्धारित समय पर लें। यदि आपकी अगली खुराक लेने में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो अपनी छूटी हुई खुराक न लें और अपने नियमित समय पर खुराक लेना जारी रखें। दोगुनी या अतिरिक्त खुराक न लें।

यदि आपकी एंटी-रिजेक्शन दवाएं 1 दिन से अधिक समय तक छूट गई हैं, तो आगे के निर्देशों के लिए फ़ौरन अपनी ट्रांसप्लांट टीम से संपर्क करें।

यदि खुराक लेने के 30 मिनट के भीतर आपको उल्टी हो जाती है या यदि आप देखते हैं कि कोई दवा बाहर निकली है, तो खुराक दोबारा लें। नहीं तो, बस अपने अगले निर्धारित समय पर खुराक लें।

इस दवा के कुछ संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं? (What are some possible side effects of this medication?)

दुष्प्रभाव	प्रबंधन
कोलैस्ट्रॉल का उच्च स्तर	स्वस्थ, संतुलित भोजन करें। वसा और चीनी की कम मात्रा वाले खाद्य पदार्थ खाएं।
उच्च ब्लड प्रैशर	अपने ब्लड-प्रैशर की नियमित तौर पर जांच करें। आपको ब्लड प्रैशर की दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है।
सिरोलिम्स आपके खून की सफेद कोशिकाओं, लाल रंग की कोशिकाओं और प्लेटलेट्स की संख्या कम कर सकती है आप संक्रमण और खून निकलने के बड़े हुए जोखिम पर हो सकते हैं	आपके खून की कोशिकाओं की संख्या की जांच करने के लिए खून का आम नियमित टेस्ट किया जाएगा। यदि आपको इन में से कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर को बताएं: <ul style="list-style-type: none"> अपनी ट्रांसप्लांट को संक्रमण के संकेत (बुखार या कंपकंपी, दिल की तेज़ गति, जुकाम और फ़्लू) के बारे में बताएं। सक्रिय संक्रमण वाले लोगों के नज़दीकी संपर्क में आने से बचने की कोशिश करें। बार बार हाथ धोएं। खून निकलने के संकेत (चोट लगना, मल आने में कठिनाई, खून की उल्टी या पेशाब में खून) खून की लाल कोशिकाएं घटने के संकेत (कमज़ोरी या थकान, थोड़े समय के लिए अचेत होना, चक्कर आना)
मुंह के अल्सर	मुंह को अच्छी तरह साफ़ करने का अभ्यास करें। दवा लेने के बाद मुंह को कुल्ला करके अच्छी तरह साफ़ करें। यदि अल्सर हो गए हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि सिरोलिम्स की आपकी खुराक कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुंह के अल्सर ठीक करने और दर्द कम करने के लिए मुंह में कुल्ला करने वाले जलन-रोधी तरल/पेस्ट दिए जा सकते हैं।
त्वचा पर लाल चकते या मुहांसे	यदि त्वचा पर लाल चकते होते हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें।
घाव भरने में देर होना	यदि यह समस्या बन गया है, तो अपनी ट्रांसप्लांट टीम को बताएं।
फेफड़े की समस्याएं	यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी है, तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें: सांस की तकलीफ़, छाती में दर्द, लगातार रहने वाली सूखी खांसी, बुखार, जो किसी अन्य बीमारी से संबंधित नहीं है।
कैंसर	यह दवा लेने से त्वचा और अन्य कैंसरों के प्रति आपके ख़तरे बढ़ सकते हैं। यदि आपका कैंसर का रोग-निदान हुआ है, तो कृपया अपनी ट्रांसप्लांट टीम को बताएं। अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया "कैंसर संबंधी जोखिम" भाग देखें।