

دابسون DAPSONE

- ◀ يتوفر هذا الدواء في شكل أقراص فموية وسائل يعد خصيصًا عند الحاجة.
- ◀ لا تمول BC Transplant هذا الدواء ويمكن شراؤه من أي صيدلية تفضلها.

كيف يبدو شكل الدواء؟

What does the medication look like?

هناك العديد من العلامات التجارية التي تنتج هذا الدواء وقد لا تجد دواءك على وجه التحديد أدناه. يرجى مراجعة صيدلي زراعة الأعضاء إذا كانت لديك أي أسئلة.



لماذا يستخدم هذا الدواء؟

What is this medication for?

يستخدم دابسون لمنع أو علاج نوع معين من الالتهاب الرئوي المعروف باسم الالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية (PCP) أو الالتهاب الرئوي الجيروفيسي (PJP). ويشيع هذا النوع من الأمراض بكثرة بين المرضى الذين يعانون من جهاز مناعي ضعيف (على سبيل المثال بعد زراعة عضو). ويستخدم دابسون عندما يكون الشخص لديه أَرَجِيَّة/حساسية من السلفا أو قد عانى من آثار جانبية بسبب دواء سلفاميثوكسازول/ تريميثوبريم.

كيف يجب أن أتناول هذا الدواء؟

How should I take this medication?

تناول هذا الدواء ثلاث مرات أسبوعيًا (على سبيل المثال ٩ صباحًا)	أوقات الدواء وأيام الأسبوع: _____
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

- يمكن تناول هذا الدواء إما مع الطعام أو من دونه.
- يمكن تناوله في أي وقت من اليوم وربما تناوله في نفس الوقت مثل أي من الأدوية الأخرى.

تفويت جرعة أو تقيؤ جرعة:

Missed Dose or Vomited Dose:

إذا فاتك تناول أي جرعة، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر من نصف الوقت الذي يفصلك عن تناول جرعتك التالية، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. لا تضاعف الجرعة أو تتناول جرعات إضافية.

إذا تقيأت خلال ٣٠ دقيقة من تناول الجرعة أو إذا رأيت بعض من الدواء يخرج من معدتك، فكرر الجرعة. وإلا، فتابع تناول الجرعات حسب مواعيدها المعتادة.

ما هي بعض الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء؟

What are some possible side effects of this medication?

السيطرة عليه	الأثر الجانبي
ارتد قبعة وأكمام طويلة وبنطال طويل أو تنورة طويلة عند الخروج في الأيام المشمسة. استخدم الكرييمات الواقية من الشمس بعامل حماية ٣٠ على الأقل.	الحساسية من الشمس
سيتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خلايا دمك. وراجع طبيبك في الحالات التالية:	قد يؤدي دابسون إلى تقليل عدد خلايا الدم البيضاء والحمراء.
<ul style="list-style-type: none"> وجود علامات أو أعراض على الإصابة بعدوى (حمى أو قشعريرة، أو سعال، أو ألم في الحلق، أو ألم عند التبول أو صعوبة ذلك) علامات على انخفاض خلايا الدم الحمراء (الضعف أو الإرهاق، نوبات إغماء، الشعور بالدوار) 	قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى والنزف.
أبلغ طبيبك أو فريق زراعة الأعضاء في أسرع وقت ممكن	طفح أو حكة بالجلد