

لامیوودین LAMIVUDINE

◀ با نام تجاری Apo-lamivudine®، Heptovir® نیز شناخته می‌شود
 ▶ این دارو به صورت قرص یا محلول خوراکی موجود است.

ظاهر دارو به چه شکل است؟ What does the medication look like?

مارک‌های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک خود را در میان مارک‌های زیر نبینید. لطفاً اگر سؤالی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.



موارد مصرف این دارو چیست؟ What is this medication for?

Lamivudine مقدار ویروس هپاتیت B را در خون کاهش می‌دهد و می‌تواند به بهبود عملکرد کبد و کاهش آسیب بیشتر کبد کمک کند.

این دارو را باید چگونه مصرف کرد؟ How should I take this medication?

این دارو را روزی یکبار مصرف کنید (به عنوان مثال 9 صبح)	زمان مصرف داروی شما:
-----------------------------------------------------------	----------------------

- این دارو با غذا یا بدون غذا قابل مصرف است.
- می‌توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با سایر داروهایتان قابل مصرف است. دارو را هر روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار (سطح دارو) در بدن شما ثابت بماند.

نوبت فراموش شده یا بالا آورده شده: Missed Dose or Vomited Dose:

اگر یک نوبت دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان مقرر مصرف کنید. اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید. داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.

اگر ظرف 30 دقیقه پس از مصرف دارو استفراغ کردید یا مشاهده کردید که مقداری از دارو بالا آمده است، مصرف دارو را تکرار کنید. در غیر این صورت، مصرف داروی خود را فقط طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید.

برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication?

عوارض جانبی	کنترل
اسهال، تهوع، استفراغ، سردرد، خستگی	همراه با غذا یا شیر مصرف شود. در صورت تداوم، به پزشک یا تیم پیوند خود اطلاع دهید.
سوزش/گزگز در دست‌ها، پاها	در صورت برطرف نشدن یا بدتر شدن، به پزشک خود اطلاع دهید.
عفونت گوش، بینی یا گلو	تب، درد گوش، فک، درد هنگام جویدن غذا، ترشحات بینی که شفاف نباشد. در صورت تداوم، به پزشک خود اطلاع دهید.
عملکرد غیرعادی کبد	در صورت بروز موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید: <ul style="list-style-type: none"> • درد شدید شکم همراه با حالت تهوع یا استفراغ • پوست یا چشم زرد رنگ، درد معده یا شکم، ادرار تیره یا مدفوع کمرنگ • تغییرات غیرقابل توضیح در ظاهر بدنتان (افزایش وزن در ناحیه کمر و/یا صورت) • درد، گزگز یا بی‌حسی در دست‌ها یا پاها