

拉米夫定 (干安能) LAMIVUDINE

- 又名 Heptovir®、Apo-lamivudine®
- 此藥為口服藥片或口服液。

藥物外型是怎樣的？ What does the medication look like?

這種藥物有幾個牌子，您的藥物可能跟下圖的不盡相同。若有任何疑問，請向您的移植藥劑師查詢。



此藥用來醫治什麼？ What is this medication for?

拉米夫定可減低血液中乙型肝炎病毒的數量，可能有助改善肝功能和減少肝臟進一步受損。

應如何服用此藥？ How should I take this medication?

此藥每天服用一次 (例如早上 9 時)	您的服藥時間： _____
------------------------	------------------

- 此藥可以隨餐或空腹服用。
- 可以在一天中任何時間服用，也可以跟您的其他任何藥物同時服用。每天都在相同的時間服藥，令體內保持穩定的藥量水平。

漏服藥物或嘔吐藥物： Missed Dose or Vomited Dose:

若漏服了一劑藥物，在記起後即盡快補服，然後按照下次的原定服藥時間服藥。若離下次服藥時間已過了一半時間，則不用補服，只需繼續按原定時間服藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若在服藥後 30 分鐘內嘔吐，或在嘔吐物中看見藥物，便須再次服藥，否則只需繼續等至下次服藥時間才服下一劑。

此藥可能有什麼副作用？What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
肚瀉、噁心、嘔吐、頭痛、疲倦	以食物或牛奶送服。若症狀持續不退，須通知您的醫生或移植團隊。
手腳有燒灼 / 刺痛感	若沒有自行減退或惡化，須通知您的醫生。
耳、鼻或喉受感染	發燒、耳痛、咀嚼時顎痛、流出混濁的鼻水。若症狀持續不退，須通知您的醫生。
肝功能異常	若出現以下症狀，請通知醫生： <ul style="list-style-type: none"> • 嚴重腹痛，同時有噁心或嘔吐 • 皮膚或眼睛泛黃、胃痛或腹痛、深色尿液或灰白色大便 • 不知原因的外表變化（腰圍及 / 或面部增磅） • 手或腳感疼痛、刺痛或麻痺