

## LETERMOVIR LETERMOVIR

- Aussi connu sous le nom de Prevymis<sup>MD</sup>
- Ce médicament est disponible sous forme de comprimé oral.

### À quoi ressemble le médicament?

#### What does the medication look like?

Comprimé de letermovir de 480 mg



### À quoi sert ce médicament?

#### What is this medication for?

C'est un médicament anti-viral. Chez les patients dont le système immunitaire est affaibli (par exemple après une transplantation d'organe), il est utilisé pour prévenir une infection virale appelée CMV (infection à cytomégalovirus) lorsque le médicament antiviral habituel, le valganciclovir, n'est pas efficace ou que la personne présente des effets secondaires au valganciclovir.

### Comment faut-il prendre ce médicament?

#### How should I take this medication?

Prenez ce médicament une fois par jour (par exemple 9 h)

Heure(s) de prise du médicament : \_\_\_\_\_

- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Il peut être pris à tout moment de la journée et peut être pris en même temps que vos autres médicaments. Prenez-le tous les jours à la même heure de la journée afin de maintenir une quantité constante (niveau de médicament) dans votre corps.
- **Il peut interagir avec d'autres médicaments. Informez l'équipe de transplantation de vos médicaments (en vente libre ou à base de plantes), y compris ceux prescrits par d'autres fournisseurs de soins.**

### Dose oubliée ou dose vomie :

#### Missed Dose or Vomited Dose:

**Si vous oubliez une dose**, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à l'heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.

**Si vous vomissez** dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament remonter, répétez la dose. Sinon, continuez avec votre prochaine dose.

### Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament?

#### What are some possible side effects of this medication?

Effets secondaires	Gestion
<b>Mal de tête</b>	Peut se résorber; votre médecin peut vous suggérer un analgésique en vente libre.
<b>Nausée, vomissement ou diarrhée</b>	Prenez ce médicament avec de la nourriture. Contactez votre médecin si ces symptômes sont persistants ou gênants.
<b>Gonflement</b>	Peut se résoudre; contactez votre médecin si cela est persistant ou gênant.