

## PENTAMIDINE

### PENTAMIDINE

- Ce médicament est administré par inhalation (inspiration) à l'aide d'un nébuliseur (un appareil qui transforme un médicament de liquide en brume) dans une clinique ou un hôpital. Il peut également être administré sous forme d'injection dans une veine.
- Ce médicament n'est pas financé par BC Transplant et peut être acheté à la pharmacie de votre choix.

### À quoi ressemble le médicament?

#### What does the medication look like?



### À quoi sert ce médicament?

#### What is this medication for?

La pentamidine est utilisée pour prévenir ou traiter un type particulier de pneumonie (infection pulmonaire) connu sous le nom de PPC ou PPJ. Ce type d'infection est plus fréquent chez les patients dont le système immunitaire est affaibli (par exemple après une transplantation d'organe). La pentamidine nébulisée (vaporisée) est utilisée lorsqu'une personne est allergique aux sulfamides ou a subi des effets secondaires au sulfaméthoxazole ou triméthoprime.

### Comment faut-il prendre ce médicament?

#### How should I take this medication?

La pentamidine est administrée par nébuliseur <b>une fois par mois</b>	Heure(s) de prise du médicament : _____
--	---

- La pentamidine est administrée en milieu hospitalier, dans une pièce désignée du laboratoire de la fonction pulmonaire.
- L'inhalation de pentamidine est administrée une fois par mois. La durée pendant laquelle vous aurez besoin de ce médicament sera déterminée par votre médecin.

### Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament?

#### What are some possible side effects of this medication?

Effets secondaires	Gestion
<b><i>Douleurs thoraciques, toux ou respiration sifflante</i></b>	On vous donnera un autre médicament (salbutamol, Ventolin <sup>MD</sup> ) à respirer avant la pentamidine pour réduire ce phénomène.
<b><i>Diminution de l'appétit</i></b>	C'est temporaire, et ça s'estompe après quelques jours.
<b><i>Étourdissements/épuisement/fatigue</i></b>	Respirez lentement; arrêtez la pentamidine au besoin.
<b><i>Toux et mal de gorge</i></b>	Utilisez des pastilles pour la gorge ou un sirop contre la toux si les symptômes sont très gênants.
<b><i>Goût amer ou métallique dans la bouche</i></b>	Rincez la bouche immédiatement après le traitement à la pentamidine. Si cela se produit pendant le traitement, vous pouvez arrêter l'inhalation et prendre un verre d'eau.