


SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIM / تری متوپریم / سولفامتوکسازول

- همچنین با نام تجاری Septra®، Sulfatrim®، Bactrim®، cotrimoxazole نیز شناخته می‌شود
- این دارو به صورت یک قرص خوراکی موجود است و در صورت لزوم به شکل مایع مخصوص ساخته می‌شود.
- BC Transplant این دارو را تامین نمی‌کند و در داروخانه مورد انتخاب خودتان قابل خریداری است.

ظاهر دارو به چه شکل است؟ What does the medication look like?

مارک‌های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک داروی خود را در قسمت زیر مشاهده نکنید. لطفاً اگر سؤالی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.



موارد مصرف این دارو چیست؟ What is this medication for?

این یک آنتی‌بیوتیک ترکیبی است که برای پیشگیری یا درمان نوعی عفونت ریوی به نام PCP یا PJP که توسط یک قارچ ایجاد می‌شود، مصرف می‌شود. این نوع عفونت در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند (به عنوان مثال پس از عمل پیوند عضو) شایع‌تر است.

این دارو را باید چگونه مصرف کنم؟ How should I take this medication?

زمان‌های مصرف داروی شما:	این دارو را روزی یکبار مصرف کنید (به عنوان مثال 9 صبح)
ساعات و روزهای هفته داروهای شما:	در صورتی که این دارو را سه بار در هفته مصرف کنید

- این دارو با غذا یا بدون غذا قابل مصرف است.
- می‌توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با سایر داروهایتان قابل مصرف است. مهم است که داروهای خود را هر روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار (سطح دارو) در بدن شما ثابت بماند.
- به همراه مصرف این دارو یک لیوان کامل آب بنوشید. این موضوع به جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه کمک می‌کند.

هشدار: این دارو متعلق به دسته داروهای سولفا است و در صورت داشتن حساسیت به داروهای سولفا، بسیار مهم است که پزشک را مطلع کنید.

نوبت فراموش شده یا بالا آورده شده: Missed Dose or Vomited Dose:

اگر نوبت یک دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان مقرر مصرف کنید. اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید. داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.

اگر ظرف 30 دقیقه پس از مصرف دارو استفراغ کردید یا مشاهده کردید که مقداری از دارو بالا آمده است، مصرف دارو را تکرار کنید. در غیر این صورت، فقط از نوبت مقرر دوز بعدی خود ادامه دهید.

برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication?

کنترل	عوارض جانبی
برای به حداقل رساندن این عارضه جانبی، دارو را با غذا مصرف کنید. اگر عارضه آزادکننده است یا تداوم دارد، با پزشک خود مشورت کنید.	تهوع، استفراغ، اسهال
اگر این عارضه آزادکننده است یا تداوم دارد، با پزشک خود مشورت کنید.	سرگیجه
در روزهای آفتابی در بیرون از خانه کلاه، لباس آستین بلند و شلوار یا دامن بلند بپوشید. از لوسیون ضد آفتاب با SPF (عامل محافظت در برابر آفتاب) حداقل 30 استفاده کنید	حساسیت به نور آفتاب
در اسرع وقت به پزشک یا تیم پیوند خود اطلاع دهید	بثورات پوستی یا خارش