


磺胺甲惡唑 / 甲氧苄啶 **SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIM**

- 又名 Septra®、Sulfatrim®、Bactrim®、複方新諾明 cotrimoxazole
- 此藥物為一種口服藥片，需要時可特別配製成液劑。
- 此藥不是卑詩省移植協會的資助藥物，病人可以在自己選定的藥房購買。

藥物外型是怎樣的？ **What does the medication look like?**

這種藥物有幾個牌子，您的藥物可能跟下圖的不盡相同。若有任何疑問，請向您的移植藥劑師查詢。



此藥用來醫治什麼？ **What is this medication for?**

這是一種混合抗生素，用來預防和治療由一種由真菌引致的 PCP 或 PJP 肺炎，這種肺炎較常見於免疫力下降（例如器官移植後）的病人。

應如何服用此藥？ **How should I take this medication?**

此藥每天服用一次 (例如早上 9 時)	您的服藥時間：_____
若是每星期服藥三次	您在一星期中哪些日子和時間服藥：

- 此藥物可以隨餐或空腹服用。
- 可以在一天中任何時間服用，也可以跟您的其他任何藥物同時服用。最好每天都在相同的時間服藥，令體內保持穩定的藥量水平。
- 服藥時喝下一整杯清水，有助預防腎臟結石。

特別注意：此藥屬於磺胺藥物類別，若對磺胺藥物有過敏反應，必須通知您的醫生。

漏服藥物或嘔吐藥物：Missed Dose or Vomited Dose:

若漏服了一劑藥物，在記起後即盡快補服，然後按照下次的原定服藥時間服藥。若離下次服藥時間已過了一半時間，則不用補服，只需繼續按原定時間服藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若在服藥後 30 分鐘內嘔吐，或在嘔吐物中看見藥物，便須再次服藥，否則只需繼續等至下次服藥時間才服下一劑。

此藥可能有什麼副作用？What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
噁心、嘔吐、肚瀉	以食物送服藥物，以盡量減少副作用。若症狀令您感到困擾或持續不退，請向您的醫生查詢。
頭暈	若令您感到困擾或持續不退，請向您的醫生查詢。
對太陽敏感	在晴朗的日子戴上帽子、穿上長袖衫及長褲或長裙。塗上防曬指數 (SPF) 達 30 或以上的防曬油。
皮膚出疹或痕癢	盡快通知您的醫生或移植團隊。