

## فالايسكلوفير

### VALACYCLOVIR

- ◀ يعرف كذلك باسم فالتريكس®
- ◀ يتوفر هذا الدواء في شكل قرص فموي.
- ◀ لا تمول BC Transplant هذا الدواء ويمكن شراؤه من أي صيدلية تفضلها.

### كيف يبدو شكل هذا الدواء؟

#### What does this medication look like?

هناك العديد من العلامات التجارية التي تنتج هذا الدواء وقد لا تجد دواءك على وجه التحديد أدناه. يرجى مراجعة صيدلي زراعة الأعضاء إذا كانت لديك أي أسئلة.



### لماذا يستخدم هذا الدواء؟

#### What is this medication for?

هذا دواء مضاد للفيروسات. وقد يتم تزويدك بدواء فالاسيكلوفير خلال الشهور القليلة الأولى بعد جراحة زراعة العضو للمساعدة على منع الإصابة بأنواع معينة من الأمراض الفيروسية، مثل الهربس، والجديري، والهربس النطاقي، والقروح الباردة.

### كيف يجب أن أتناول هذا الدواء؟

#### How should I take this medication?

وقت الدواء:	تناول هذا الدواء مرة يوميًا (على سبيل المثال ٩ صباحًا)
وقت الدواء:	تناول هذا الدواء مرتين يوميًا (على سبيل المثال ٩ صباحًا و٩ مساءً)

- يمكن تناول هذا الدواء إما مع الطعام أو من دونه.
- يمكن تناوله في أي وقت من اليوم وربما تناوله في نفس الوقت مثل أي من الأدوية الأخرى. ويجب تناوله في نفس الوقت كل يوم للحفاظ على وجود كمية ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.

### تفويت جرعة أو تقيؤ جرعة:

#### Missed Dose or Vomited Dose:

إذا فاتك تناول أي جرعة، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر من نصف الوقت الذي يفصلك عن تناول جرعتك التالية، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. لا تضاعف الجرعة أو تتناول جرعات إضافية.

إذا تقيأت خلال ٣٠ دقيقة من تناول الجرعة أو إذا رأيت بعض من الدواء يخرج من معدتك، فكرر الجرعة. وإلا، فتابع تناول الجرعات حسب مواعيدها المعتادة.

### ما هي بعض الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء؟

#### What are some possible side effects of this medication?

السيطرة عليه	الأثر الجانبي
تناول الدواء مع الطعام أو الحليب. قد تتوقف الأعراض، ولكن أبلغ طبيبك إذا استمرت الأعراض.	غثيان، قيء، إسهال

قد تتوقف الأعراض. قد يقترح طبيبك استخدام مسكن للألم دون وصفة طبية.

صداع