

纈更昔洛韋 VALGANCICLOVIR

- 又名克毒癒 Valcyte®、Apo-valganciclovir®、Auro-valganciclovir
- 此藥物為一種口服藥片及口服液。

藥物外型是怎樣的？ What does the medication look like?

這種藥物有幾個牌子，您的藥物可能跟下圖的不盡相同。若有任何疑問，請向您的移植藥劑師查詢。

纈更昔洛韋 450 毫克藥片



此藥用來醫治什麼？ What is this medication for?

這是一種抗病毒藥物。對於免疫力下降（例如器官移植後）的病人，最常用於預防或治療一種名為 CMV（巨細胞病毒）的病毒感染。

應如何服用此藥？ How should I take this medication?

此藥每天服用一次 (例如早上 9 時)	您的服藥時間： _____
此藥每天服用兩次 (例如早上 9 時及晚上 9 時)	您的服藥時間： _____

- 此藥應隨餐送服，以助身體能更好吸收藥物。
- 可以在一天中任何時間服用，也可以跟您的其他任何藥物同時服用。每天都在相同的時間服藥，令體內保持穩定的藥量水平。

漏服藥物或嘔吐藥物：Missed Dose or Vomited Dose:

若漏服了一劑藥物，在記起後即盡快補服，然後按照下次的原定服藥時間服藥。若離下次服藥時間已過了一半時間，則不用補服，只需繼續按原定時間服藥，切勿服用雙倍劑量或額外的劑量。

若在服藥後 30 分鐘內嘔吐，或在嘔吐物中看見藥物，便須再次服藥，否則只需繼續等至下次服藥時間才服下一劑。此藥可能有什麼副作用？What are some possible side effects of this medication?

副作用	管理方法
噁心、嘔吐、肚瀉	以食物送服。若症狀持續或令您感到困擾，請聯絡您的醫生。
<p>纈更昔洛韋可降低白血球、紅血球和血小板的數量。</p> <p>受感染和流血的風險可能提高。</p>	<p>定期驗血檢查各項血液細胞指數。若出現以下任何一個情況，須諮詢您的醫生：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 感染跡象或症狀，例如發燒或發冷、咳嗽、喉嚨痛、小便疼痛或排尿困難 • 出血跡象，例如有瘀血、黑便、嘔血或尿液帶血 • 紅血球下降的跡象，例如感到異常虛弱或疲倦、短暫暈眩或頭暈