

## Fیلگراستیم FILGRASTIM

- با نام‌های G-CSF، Neupogen®، Grastofil® نیز شناخته می‌شود
- به شکل سرنگ 300 میکروگرم یا 480 میکروگرم از پیش پر شده برای تزریق موجود است

### ظاهر دارو به چه شکل است؟ What does the medication look like?



### موارد مصرف این دارو چیست؟ What is this medication for?

- داروهای ضد پس زدن، آنتی‌ویروس، آنتی‌بیوتیک یا ترکیبی از این داروها ممکن است گلبول‌های سفید شما را کاهش دهند. این باعث کاهش توانایی بدن شما برای مبارزه با عفونت می‌شود. Filgrastim به مغز استخوان شما می‌گوید که گلبول‌های سفید بیشتری بسازد و خطر ابتلا به عفونت را کاهش دهد.

### این دارو را باید چگونه مصرف کرد؟ How should I take this medication?

تعداد گلبول‌های سفید شما تعیین می‌کند که به چه میزان filgrastim نیاز دارید. معمولاً تا 3 روز تزریق روزانه دریافت می‌کنید و پس از آن دوباره تعداد گلبول‌های سفید خون شمارش می‌شود تا اطمینان حاصل شود که میزان مناسب را دریافت کرده‌اید.

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| این دارو معمولاً به مدت 3 روز به صورت روزانه تزریق می‌شود | تاریخ‌ها و زمان مصرف داروی شما: _____ |
|---|---------------------------------------|

- Filgrastim ممکن است به صورت زیرجلدی (تزریق زیر پوست) تزریق شود. پرستار کلینیک می‌تواند به شما نشان دهد که چگونه در خانه دارو را به صورت زیرپوستی تزریق کنید.

### نوبت فراموش شده یا بالا آورده شده: Missed Dose or Vomited Dose:

اگر یک نوبت دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان مقرر مصرف کنید. داروی خود را دوبار نزنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.

اگر برای دریافت تزریق به کلینیک مراجعه می‌کنید، مهم است که سر وقت مقرر خود مراجعه کنید و هیچ روزی را فراموش نکنید. اگر نوبت‌های تزریق را فراموش کنید این دارو درست کار نخواهد کرد و دوز فراموش شده با زیاد کردن میزان دوز جبران نمی‌شود.

### برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

### What are some possible side effects of this medication?

| عوارض جانبی               | کنترل  |
|---------------------------|--|
| سوزش در محل تزریق         | قابل رفع شدن است؛ ممکن است پزشک شما یک مسکن بدون نسخه یا کمپرس سرد پیشنهاد کند.  |
| درد استخوان، مفصل یا عضله | آزمایش خون منظم برای بررسی تعداد گلبول‌های سفید شما انجام خواهد شد. زیرا در صورت مصرف بیش از حد، عوارض جانبی بیشتری تجربه خواهید داشت. |
| سررد، علام شبه-آنفلانزا   | قابل رفع شدن است؛ ممکن است پزشک شما یک مسکن بدون نسخه پیشنهاد کند.   |